



MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS, 67E JAARGANG NO.2, FEBRUARI 2006

ONZE VOGELS



De

se

Foto-impres



De /

ose /

NB
200

De Beste Vogel 2006.



Beste


De

ONZE VOGELS

ISSN 0030-3224

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS (OPLAGE 35.500)

Onze Vogels is een maandblad, uitgegeven door de NBvV, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Voor meer informatie over de NBvV, haar doelstellingen en het lidmaatschap verwijzen u naar de rubriek "Bondsmedelingen" achter in dit blad. De leden van de NBvV krijgen dit maandblad op grond van hun lidmaatschap automatisch thuis gezonden.



Vogel 2006 38

VERDER IN DIT NUMMER	pagina
Foto-impresie Vogel 2006.	38
Vogel 2006, wederom een succes.	42
Winnaars vogel 2006	44
Ringbestelling 2007	49
Bestelformulier ringjaar 2007	54
Aanvraagformulier Europese en andere beschermde vogels	55
Volière van de maand	58
Kalender 2006 februari	59
Een jaar rond vogels houden	60
Column	62
Vraag en aanbod	62
NBvV super ledenwerfactie 2005/2006	65
Bijzondere kweek met de hop	66
Bondsmedelingen	68
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers	70
De Vink	71



Bijzondere kweek met de hop 66

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd op 20 maart 2006

Colofon

UITGEVER

"Onze Vogels" is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 34.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van "Onze Vogels" bedraagt 35.500 exemplaren. Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de bijna 600 plaatselijke afdelingen van de bond. Ook bestaat de mogelijkheid verspreid lid te worden.

Met ingang van 1-1-2006 geldt voor buitenlandse leden van afdelingen voor de betalen contributie naar de afdeling een toeslag van € 25,52 aan extra portkosten voor Europa. Desgewenst kan men via de secretaris van de afdeling aan het bondsbureau melden dat men voor een postadres binnen Nederland kiest. Men voorkomt hiermee de extra portheffing. Voor buiten Europa dient men het tarief op te vragen.

ADRES

NBvV, Postbus 74
4600 AB BERGEN OP ZOOM
tel. 0164-235007 e-mail: info@nbvv.nl
fax 0164-239020 website: www.nbvv.nl
Bankrekening: 46.89.59.262
Postbank: 11.48.324
Voor België: 000-0156074-01
T.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers

REDACTIE

Redactie: Gea Stoop, de Perponcherstraat 44
2518 SW Den Haag (tel. 070-3461831
e-mail: onzevogels@hetnet.nl)
Kanaries: Henk van der Wal en Gea Stoop
Tropen en grondvogels: Jan de Nij
Tekstcorrectie: Jan Huijtmans

ZAKELIJKE ADVERTENTIES

Tarieven voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen bij Piet Deley op het bondsbureau in Bergen op Zoom. Voor "vraag en aanbod advertenties" wordt verwezen naar de desbetreffende tarieven en voorwaarden elders in dit blad. De sluitingstermijn voor zakelijke advertenties is uiterlijk 6 weken voor verschijnsdatum. "Onze Vogels" wordt in de laatste volle week van de maand ter post bezorgd.

ABONNEMENTSPRUZEN

Vanaf 1 januari 2006 gelden de volgende abonnementsprijzen:
Nederland € 25,00, België € 27,00,
Europa € 48,00, buiten Europa € 62,00.
Voor verzending per luchtpost geldt een ander tarief, afhankelijk van het land van bestemming. Dit kan worden aangevraagd bij het bondsbureau. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

VERSPREID LIDMAATSCHAP

Iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdelingsvereniging kan verspreid lid worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost € 35,- per jaar.

VERANTWOORDELIJKHEID

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeeltes daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

FOTO VOORPLAAT:

KANARIE ROOD INTENSIEF

FOTO: PIET ONDROEGELINDEN/JAN DE NIJ

ONTWERP EN DUK:

PLANTINGSCAPRIE CAPELLE A/O USSEL BV
POSTBUS 550, 2900 AN CAPELLE A/O USSEL

Een jaar rond vogels houden

Een artikelenreeks die een jaar lang de maandelijkse gang van zaken volgt rond een heel gewone maar toch uitgebreide vogelliefhebberij.

Wilt u reageren, heeft u op of aanmerkingen, ideeën, of suggesties, mail gerust naar het e-mailadres onder dit artikel.

Net terug uit Apeldoorn, mensen wat was het weer een geweldige manifestatie, met 99,8 % tevreden gezichten en veel lof voor al diegenen die zich ingespannen hebben om ook dit jaar weer het visitekaartje van de NBvV af te geven. In tegenstelling tot voorgaande jaren speel ik de laatste 3 jaar nog maar een stuk of drie tentoonstellingen, gewoon omdat 6-7 tentoonstellingen per seizoen toch een beetje veel begon te worden, bij al de andere activiteiten die ik er binnen de hobbybeleving nog op na houd. En dat bevalt goed; alle TT vogels die ik opgekooid had spelen in ploegen en om de beurt ging er een andere ploeg naar de wedstrijd. Met nog enkele andere vogels werden voor Vogel 2006 die vogels uitgezocht welke het best gespeeld hadden en het schertst de verbazing dat een goudisabel die nog niet eerder weg was geweest in Apeldoorn zilver haalde. Een leuke opsteker en prima afsluiting van het TT seizoen. Op de internationale TT te Reusel (N.Br.) werd in de prijzen gespeeld en op de districts tt werd goud, zilver en 2x brons gehaald. Voor het eerst in zes jaar geen kampioen op de districts TT. Wat maakt het uit? Op de eerste plaats sportiviteit om ook andere de hoogste eer te gunnen die er is, en op de tweede plaats een mogelijk signaal om scherp te blijven en je best te doen om a.s. TT seizoen weer of nog beter voor de dag te komen. Maar ook daar moet je een beetje geluk bij hebben en beste mensen het is en blijft hobby, en sport waar een felicitatie en schouderklop naar je conculgea de mooiste en sportiefste eer is die er te behalen is!

Het TT seizoen 2005 ligt achter ons, de shows zijn voorbij, en de show must go on! Dus weer met twee voetjes op de grond en zo u nog niet aan het kweken bent zijn we in volle voorbereiding om dat op niet al te lange termijn te gaan doen. De overpeinzingen in mijn vorige artikel waren misschien niet om vrolijk van te worden, maar het is wel een goede zaak om toch eens stil te staan en terug te kijken naar de resultaten van het kweekseizoen van het voorgaande jaar of voorgaande jaren. Mijn schoonvader had altijd een boerderij en als hij bij mij in de vogelkooi kwam verwonderde hij zich vaak over de wijze zoals ik met de vogels bezig was, ze aan elkaar koppelde en hem vervolgens uitlegde wat ik van die koppels verlangde. Veel jongen, prima kleur en hoge punten. Vaak zei hij dan "jij denkt de natuur te kunnen dingeren, maar vergeet dat maar gerust jongen, de natuur laat zich niet sturen ook door jou niet!" Wijze praat van een man die toen 84 was en ik antwoordde hem dan "daar heb je wel gelijk in pa, maar een handje helpen kan ik die natuur toch wel!" Hij grinnikte dan eens en je kon dan aan zijn gezicht zien wat hij dacht. Ik denk daar nog vaak aan en denk even zo vaak "die pa was zo gek nog niet!" Je stuurt die natuur niet en menigeen onder u zal beamen dat uitkomsten van kweekvoorspellingen vaak anders uitpakken dan de vermoedens en al je berekeningen. De mooiste koppels laten het afweten, of geven weinig jongen, de middenmoot doet het goed en geeft betere en meer jongen dan je denkt, en dat koppel wat je als laatste bij elkaar hebt gezet ondanks dat je er aan twijfelde bracht relatief mooie jongen voort waarvan je op de rand van het nest al zei "hé die wordt het!" Maar zo ik zei, de show must go on en met

de kweek 2006 staan we weer voor een nieuwe uitdaging. Tot voor een jaar of vijf geleden begon ik altijd eind december begin januari te kweken maar toen de vrije tijd in die periode aanzienlijk minder werd is gekozen om zoals vanouds maar weer medio Maart te beginnen. 19 Maart ofwel Sint Jozefdag volgens goed katholiek gebruik de dag om de vogels de koppelen. De constatering die ik daarbij de laatste jaren doe is dat het uiteindelijk totaal niets uitmaakt of je nu met kerstmis al jongen hebt liggen of dat je half Maart pas begint te kweken. Wat voor mij wel vast staat is dat wanneer de kweek pas half Maart begint de daarop volgende rui veel sneller gaat hetgeen mijn inziens de vogels ten goede komt. De kweek moet vlot gaan en mijn streven met mijn kanariekekerij is dat het met twee goede rondes bekeken moet zijn. Nestjes die met hangen en wurgen groot worden en uiteindelijk over drie ronden vier, drie of minder jongen opleveren zetten geen zoden aan de dijk en alles wat met dat zelfde hangen en wurgen groot wordt zal u op geen enkel vlak nog enig resultaat geven. Daarom kom ik wederom terug op verzorgen, verzorgen en nog eens verzorgen, en even zo veel selecteren, selecteren en nog eens selecteren. Nu zullen velen onder u al denken, jij hebt mooi praten met je vogelmagazijn met meer dan 100 kweekvogels waar je dertig koppels uit gaat samenstellen; ik heb 8 mannen en tien poppen en daar moeten 8 koppels uit komen. En dan heeft u zonder meer gelijk met alle respect. Maar ook dat kan; alleen zult u dan zeker zo secuur moeten zijn met de verzorging en gaat selecteren ruim plaats maken voor observeren. U zult uw doelstellingen wat bij moeten stollen zulks zeker in relatie tot de tijd die u beschikbaar heeft voor uw



hobby. Het is nog maar zo'n tien jaar geleden dat ook ik kweekte met acht koppels en daar jaarlijks een zestig jongen van had. Het voordeel van minder vogels in je hok is dat ze zonder meer meestal al meer ruimte hebben waardoor ze zich beter kunnen ontwikkelen naar de kweek, elke vogel heeft individueel meer kansen vooral aan de zaad en krachtvoer schaal en het allergrootste voordeel is dat de kweker van iedere vogel nagenoeg het doen en laten kent en dus precies het wel en wee van iedere vogel weet. Daarom het observeren en mocht er dan, ook als u niet zo veel vogels heeft, eens iets fout gaan dan kunt u altijd nog bij en bevriende kweker eens op bezoek gaan om te zien of hij u mogelijk uit de brand kan helpen. Als ik met dertig koppels ga kweken heb ik doorgaans een knap aardige reservebank met een twintigtal poppen en een tiental mannen. Daardoor ben ik niet afhankelijk en kan ik als mijn eigen kweek eenmaal goed draait een andere liefhebber nog eens vooruit helpen. Als u nog niet aan het kweken bent is het geen luxe zo nu en dan eens een vogel uit de vlucht te halen en de bevedering op de buik eens op te blazen. Vogels die broedrijp worden verliezen bevedering op hun buik, (waar ze in vlucht graag mee slepen). De kleur van de buik moet doorgaans huidkleurig zijn (behalve bij vogels met recessief wit faktor waar deze paarsachtig is). Bij de popjes gaat de buik langzaam een peervorm aannemen en de mannen zullen zoals in vogeltermen gesproken duidelijk tekenen, dus tonen dat ze man zijn. In de aanloop naar de kweek ga ik het aantal keren dat er

opfokvoer verstrekt wordt omhoog brengen naar drie maal per week, waarbij erop gelet wordt dat de vogels niet te vet worden. Een stevig buikje vooral bij de poppen mag ik graag zien immers zij moeten weer veel energie leveren tijdens de kweekperiode. Daarom geef ik 4 tot 6 weken voor de kweek alle vogels gedurende een week lang een stevige vitaminen kuur door het drinkwater met het preparaat WM-Forte van Witte Molen. Het zijn de kleine zilverkleurige zakjes met een doseerlepeltje en goede gebruiksaanwijzing wat al vele jaren op de markt is en waar in mijn beleving geen enkel ander vitaminepreparaat tegenop kan. Elke goede dierenwinkel heeft dit op de plank liggen. Vanaf deze vitaminen-week tot en met de aanvang van de kweek doe ik onder een boterhambordje eivoer een dessertlepel blauw maanzaad. Deze wijsheid heb ik uit een oud vogelboekje en het probleem met zo genaamde zwetende poppen die nesten bevullen en waar jongen ten dode opgeschreven zijn komt bij mij zeer weinig voor. Verder begin ik zo nu en dan met wat gekiemd zaad te geven en dat gewoon omdat de vogels het lekker vinden, en er de jongen goed van en mee voeren. Op het hele voedingsgebeuren verder geen fratsen en zeker geen kuren met ES83, Bytril, Baycox, medisch zoutzuur of andere toestanden. Als ik vanaf de rui tot de kweek goed voor mijn vogels gezorgd heb hoef ik mij geen zorgen te maken, en het zgn. kuren uit voorzorg vind ik pure onzin. Al dat soort spul is klingklare dope voor uw vogels en als ze er eenmaal aan gewend zijn kunnen ze niet

meer zonder. Neemt u morgen aspirine als u geen hoofdpijn heeft? of gaat u naar uw huisarts voor een antibiotica kuur terwijl u springlevend, kerngezond en topfit bent? Wellicht zult u zeggen "maar als er nu een paar tussen zitten die" Nou die paar worden bij mij uitgeselecteerd voor de kweek en doen dus niet mee. En als u zo weinig vogels heeft dat er ook weinig te selecteren valt dan is het u met enige observatie al lang opgevallen dat die ene of twee er niet goed uitzagen al weken of maanden voor de kweek begint. Wie consequent denkt zal nu dan zeggen "En waarom geef je dan wel die extra vitaminen?" Daar kan ik kort en krachtig over zingen, gewoon om naast de uitstekende verzorging die de vogels gehad hebben hen nog een extra portie power mee te geven voor de prestatie die ik van hen ga verlangen. Ook al kan ik de natuur dan niet sturen, ik zal toch blijven trachten haar een handje op weg te helpen naar een richting die mij goed uitkomt. Groeten en tot volgende maand,

Henk van Hout
E-mail: info@vanhoutelektro.nl

Wegens de vele reactie's op het artikel van Budgerigars - uit het decembernummer - maakt redactie bekend dat het e-mailadres van de schrijver veranderd is in:
www.Bush-Budgies.nl

Grootste vogelmarkt van Europa Zaterdag 11 maart 2006



Met alles voor uw vogelhobby van papegaai tot voliëres, van kanaries tot alle vogelvoerders van parkieten tot tropen, info door deskundigen kortom:

Alles voor de echte vogelliefhebber

Plaats: markthallen aan de marktstraat te **Meppel**

Open: 10.00 tot 15.30 uur
Entree: € 2,50
Kinderen tot 14 jaar gratis

Voor gratis parkeren volg de borden langs de A28 en de A32

Voor meer info: www.vogelweeldemeppeel.nl of bij marktmeester H. Smeenge 0522-491759.

De volgende markt is zaterdag 7 oktober 2006.

SCHERPE MAAGKIEZEL

* voor kanaries, tropen, wildzang, kleine parkieten, etc. * voor grote parkieten, papegaaien, kwartels, fazanten, etc. * voor postduiven.

Uw vogels hebben geen tanden. Wel een spiermaag. Zorg dat er scherpe kiezel in zit!

VERKRIJGBAAR IN ALLE DIERENSPECIALZAKEN.

NU OOK OESTERSCHELPENGRIT

Gratis monster en folder bij:

F. THIJSEN MILL

SPECIALIST IN SCHERPE MAAGKIEZEL

Tel. (0485) 45 17 37 - Postbus 29, 5450 AA MILL



Aluminium volleres
op maat gemaakt.

Bel voor een
gratis offerte:

0522-281776

of kijk op: www.waluvo.nl

Bijzondere kweek met de hop

(Upupa epops)

De grootte is ongeveer te vergelijken met een tortelduif. Zijn roodbruin verenkleed met daarop de zwarte en witte velden en ook nog zijn zeer beweeglijke en opvallende kuif maken van deze vogel toch wel een opvallende verschijning. Vooral wanneer de hop vliegt, is het een lust dit te mogen aanschouwen; als een vlinder dwarrelt hij door de lucht. Zijn lange puntige snavel, die licht gebogen is, verradert dat hij een insecteneter is. En zijn stevige poten laten zien dat hij gedeeltelijk een grondvogel is, want hij foerageert altijd op de grond. Verspreiding is nagenoeg mondiaal, uitgezonderd in de koude gebieden. Vooral in Zuid-Europa is hij een vrij bekende verschijning. De habitat van de vogel bestaat uit bosrijk gebied, savanne, grasvelden, akkers en boomgaarden. Het nest is een holte in een boom, een nis of een gat in bijv. een stapel stenen. Gemiddeld worden er zo'n acht eieren gelegd die wit/geel zijn; deze kleur verandert naarmate ze langer bebroed worden. De broedtijd is zo'n vijftien dagen en de jongen verlaten het nest na zo'n vier weken. In de natuur voeden de ouders hun jongen met insecten, wormen, kleine reptielen en wat er verder over de grond kruipt en sluipt. In sommige gebieden zijn het standvogels en uit andere gebieden trekken ze weg.

Verzorging

Het voedsel dat wij aan de hoppen geven, bestaat uit meelwormen en moriowormen als basisvoer; daarbij kun je nog wasmotten, kreukels, sprinkhanen en eventueel regenwormen geven. Zelf vind ik de regenworm een

te groot risico i.v.m. de parasieten die in de regenwormen kunnen huizen. Dit alles wordt bepoederd met Aves insectenstrooipoeder en wat spirulina.

Water wordt nooit gegeven, hoppen hebben een hekel aan nat en vocht, ook geen bad-

water. Wanneer hoppen water tot hun beschikking hebben, is de kans erg groot dat de snavel afbreekt door het vocht. Het vocht dat ze nodig hebben, halen ze uit de voeding, en badderen doen ze in het zand!

Nestgelegenheid

Ik gebruikte hiervoor een natuurblok van ongeveer een meter hoog met een binnendiameter van ongeveer twintig cm. En hoog veertig cm. Met een invlieggat van ongeveer acht cm. Dit was geplaatst op een stapel stenen en het invlieggat bevond zich ongeveer anderhalve meter van de volièrebodem. Nestmateriaal was speelzand, omdat hierin geen scherpe steentjes zitten; anders zouden de eieren wel eens kapot kunnen gaan.

De kweek

Sinds de aanschaf hebben de vogels bij elkaar gezeten. Gedurende de koude wintermaanden hebben ze binnengezeten bij een temperatuur van zo'n vijf graden Celsius. Dit niet zo zeer vanwege de kou, maar meer vanwege de vochtigheid. Want, zoals gezegd, aan vocht hebben ze echt een hekel. De man begon eind december met de rui, de pop pas half februari. Ik dacht dat dit misschien wel eens te laat kon zijn met het oog op de eventuele kweek.



vliegende hop



volwassen hop op de SEC in Rosmalen



De pop was overigens pas eind maart klaar met de rui. Op 29 maart zijn beide vogels in een volièrre geplaatst met een grootte van 2,5m breed, 2,5m lang en 2m hoog. Dit zonder nachthok. De temperatuur buiten was al een tijdje rond de vijftien graden Celsius. Op 4 april zie ik de man de pop geregeld wat voer aanbieden. Op 20 april een honderd procent paring gezien. Op 25 april

nestcontrole gedaan en nog geen ei geconstateerd. Wel wordt de pop elke dag getreden en laat de man zijn roep regelmatig horen. Op 29 april hoor ik de man niet meer en dus is er verandering in de situatie opgetreden. Ik ben gaan kijken en het eerste ei was gelegd. De pop zit vanaf nu erg vast en komt nog maar één keer per dag uit het nestblok om zich te ontlasten. Hoppen zouden tot acht eieren kunnen produceren in één nest volgens de beschikbare informatie. Na tien dagen vanaf het eerste ei geteld even gekeken en er bleken zes eieren te zijn gelegd. Ik had in mijn documentatie wel eens gelezen dat de eieren verkleuren als deze bevrucht zijn, naarmate ze langer bebroed worden. Bij mij was dit totaal niet het geval, dus ik dacht dat het gehele nest onbevrucht was, maar ergens twijfelde ik en toen heb ik de eieren gedompeld in een bakje met lauw water en daaruit bleek dat alle eieren bewogen en dus bevrucht waren.

Op 17 mei werd het eerste jong geboren, op 18 mei jong twee en drie en op 19 mei jong vier en vijf. Het zesde ei kwam niet uit. Het ouderkoppel bestond uit vogels van ongeveer een jaar oud en dat kan soms nog wel eens problemen opleveren vanwege de jonge leeftijd. Het voeren van de jongen ging niet geweldig en zo had ik op 21 mei nog drie jongen over. Dit voeren gebeurde als volgt. Ze kregen meelwormen, moriowormen, wasmotten en krekels tot hun beschikking. De man neemt voedsel op, brengt dit naar het blok en geeft het door het invlieggat aan de pop. De pop geeft dit vervolgens weer aan de jongen. Ik heb de man nooit in het broedblok gezien. Als ik op drieëntwintig mei de jongen wil ringen, zie ik dat er nog twee over zijn. Deze heb ik geringd met de



kapstudie van hop op de SEC in Rosmalen

wettelijk voorgeschreven ring van 4.5mm. Op 1 juni zie ik de pop uit het blok en ze helpt nu de man met het voeren van de jongen. Ook nu gaat de man nog steeds niet in het nestblok, maar voert hij de jongen direct door het invlieggat. Op 11 juni vliegen de jongen uit en zitten dan al volledig in hun bevedering. Ze kunnen vrij snel heel goed vliegen. Op 13 juni verdwijnt de pop weer in het nestblok en dat resulteerde in het eerste ei van ronde twee. Op 26 juni heb ik de jongen uitgevangen, want deze waren al een poosje zelfstandig en het nieuwe nest stond op uitkomen. Meteen heb ik even het aantal eieren gecontroleerd en er bleken weer zes eieren te zijn gelegd. Op 4 juli liggen er weer zes jongen

in het blok. Het ringen, voeren en het uitvliegen ging zoals in ronde één en op 7 augustus heb ik de jongen uitgevangen, want op 29 juli was alweer ronde drie begonnen met het eerste ei. Deze ronde verliep anders dan de eerste twee rondes, want nu werden er tien eieren gelegd en zeven jongen grootgebracht.

Resumerend

Een jong koppel van ongeveer een jaar oud kan heel goed nesten grootbrengen. De eieren hoeven niet altijd te verkleuren. Op de vijfde à zesde dag oud de jongen ringen met 4.5mm. Voer voor de vogels bestaat uit meelwormen, wasmotten, moriowormen en krekels of sprinkhanen. De schoonheid van de vogels maakt hen tot een populaire vogel, de roep is zuiver maar zeer eentonig. Op naar de volgende uitdaging.

Tekst: Arie Bakker

Foto's: Jan de Nijs en Piet Onderdelinden



jonge hop 2 dagen oud



jonge hop 6 dagen oud



Hop met jongen in het blok



zwartkops hop

Korrektie in advertentie Zwolse Vogelmarkt

In de advertentie van de Zwolse Vogelmarkt in het januarinummer 2006 van Onze Vogels op blz. 28 stond vermeld dat de volgende vogelmarkt zou zijn op 16 september 2006. Dit moet echter zijn:

Zaterdag 23 september 2006



VOGELMARKT BOSKOOP

Een must voor iedere vogelliefhebber
Iedere 1e zaterdag v/d maand t/m april 2006
ZAAL : Stichting Beurshal, ITC terrein, Italiëlaan 8,
Hazerswoude-dorp.
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.
Voor meer info: www.vogelmarkt.nl



De vink (*Fringilla c. coelebs*)

De vink behoort tot de subfamilie Fringillinae, een tak van de omvangrijke familie der vinkachtigen. De vink telt maar liefst 14 ondersoorten en komt voor in vrijwel geheel Europa. Opmerkelijk is dat de zang van streek tot streek verschilt. Zelfs in een klein land als Nederland herkent de vinkenier verschillende dialecten. De hier broedende vinken zijn grotendeels standvogels. In de wintermaanden zien we vinken ook wel in het gezelschap van de keep.

De vink is een zaad/insecteneter. Jonge vinken worden de eerste periode uitsluitend met insecten gevoed. Hiervoor komen in aanmerking meelwormen, pinky's, miereneieren, kreukels e.d. Er kan ook een premix verstrekt worden met daarin voldoende dierlijke eiwitten. De vink is een territoriumvogel, dus kweek met de vink bij voorkeur in kweekboxen van ca. 0,80m breed, 2m hoog en 2m diep. De vink bouwt haar nest graag in een harzerkastje of kapelletje. Voor de nestbouw gebruikt de vink graag lichte materialen. Als de vinkman broedrijp is, heeft hij een staalblauwe snavel. Het formaat van de ideale vink geeft een forse indruk met een lengte van 15cm gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart. Het model is volslank. De kop wordt iets opgericht gedragen en moet een regelmatig gebogen lijn vormen. De rug moet vanaf de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. De borst- buiklijn moet vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren een regelmatig gebogen verloop hebben. De borst dient vol en rond te zijn.

Bij de man zijn schedel en nek leiblaauw, de wangstreep en keel zijn bruinrood. Aansluitend aan de basis van de bovensnavel loopt een smalle zwarte voorhoofdsband. De wijnrode kleurafschieding heeft een scherp afgelijnd en symmetrisch verloop. Op het lichaam zijn de borst en flanken en bovenbuik wijnrood. Onderbuik en aarsstreek zijn gebroken wit. Rugdek en mantel zijn kastanjebruin, de onderrug en stuit olijfachtig groen. De scheiding tussen de leiblaauwe nek en de kastanjebruine mantel moet strak afgelijnd zijn. Hand- en armpennen, grote vleugeldekveren en duimveertjes zijn zwart, de kleine vleugeldekveren blauwzwart en schouderdekveren leiblaauw. De buitenvlaggen van de hand- en armpennen hebben een lichtgele omzoming, de veertoppen van de grote vleugeldekveren zijn crème wit en vormen een vleugelstreep.

Op de buitenvlaggen van de handpennen, met uitzondering van de drie buitenste, bevindt zich een witte vlek, die tezamen een vleugelspiegel vormen. De middelste vleugeldekveren zijn lichtgeel en vormen samen een lichtgeel vleugelschild.

De staart is zwartbruin. De drie buitenste staartpennen zijn grijswit gebandeerd. De bovenstaartveren, waarvan de twee middelste de lengte van de staartpennen hebben, zijn bruinachtig donkergrijs. De onderstaartdekveren zijn wit met een bruinachtig waas. De buitenvlaggen van de staartpennen zijn bleekachtig groen omzoomd, de bovenstaartdekveren bezitten een bruine omzoming.

Bij de pop zijn voorhoofd, schedel en nek olijfbraun. De wangen en keelstreep zijn iets lichter olijfbraun. De wenkbrauwstreep is crèmekleurig, lopend vanaf de snavel boven langs het oog tot vrijwel in de nek. Borst, flank en dijen zijn diep grijsbruin. Onderbuik en aarsstreek zijn gebroken wit met een bruin waas bij de aars.

Rugdek en mantel zijn donkerolijfbraun, onderrug en stuit donkerolijfgroen. Het onderste deel van de stuit vertoont een fijne zwart/grijze streepjesteekening. De hand- en armpennen, de grote vleugeldekveren en de duimveertjes zijn zwartbruin. Schouderdekveren en kleine vleugeldekveren zijn donkerolijfgroen. De vleugeltekening is gelijk aan die van de man. De staartpennen zijn zwartbruin. De bovenstaartdekveren zijn zwartbruin. De bovenstaartdekveren, waarvan de twee middelste de lengte hebben van de staartpennen, bruinachtig donkergrijs. Onderstaartdekveren wit met bruin waas. De buitenvlag van de staartpennen is vaag crèmekleurig omzoomd. De drie buitenste pennen zijn wit gebandeerd. De bovenstaartdekveren zijn vaag omzoomd.

Een vink dient voor een tentoonstelling te zijn afgericht. Er dient goed gelet te worden op het model. De vleugeltekening moet regelmatig en symmetrisch zijn. Borst- en flankkleur zo diep en egaal mogelijk.

Bij de pop mag er geen inktvlek aanwezig zijn, de wenkbrauwen behoren strak afgelijnd te zijn. Bij de man moet een voorhoofdsband waarmeembaar aanwezig zijn.

Tekst: Frans Pijnen - Jan de Nijs
Foto's: Frans Pijnen