

# onze vogels

33e jaargang no.5, mei 1972



maandblad van de nederlandse bond van vogelliefhebbers



# NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS

## BONDSBESTUUR

**Voorzitter:** A. van Liempd, Dr. Kuiperstr. 10, Breda, telefoon (01600) 3 61 37.

**Secretaris:** Joh. M. van Pelt, Vlaardingerdijk 331a, Schiedam, telefoon (010) 26 19 90.

**Penningmeester:** J. van Splunter, Vijverberg Zuid 44, Bergen op Zoom.

**2e Voorzitter:** E. Adema, Roggestraat 30, Apeldoorn, telefoon (05760) - 1 86 31.

**Commissaris:** J. J. Krol, Trompstraat 16, Mepel, telefoon (05220) 5 38 84.

Juridisch adviseur: Mr. L. van Elderen.

## DISTRICTSVOORZITTERS

District Groningen: W. Wolthof, Kerkstraat 40, Muntendam, telefoon (05987) 33 40 of 33 25

District Friesland: J. Forsten, Zuiderkade 2, Mollenpolle, Franeker, telefoon (05170) 29 68

District Drente: A. F. Smit, Groningerstraat 169, Assen, telefoon (05920) 1 49 37

District Overijssel: A. M. van Rijn, Pr. Margrietstraat 41, Haaksbergen

District Gelderland: D. J. Prinsen, Pater Hafkenscheidstraat 11, Ulft, telefoon (08356) 10 71

District Utrecht: J. G. Harskamp, Pr. Beatrixlaan 25, IJsselstein, tel. 03478-2125.

District Noord-Holland: A. J. F. Lammerse, Oude Krulsweg 104, Vijfhuizen, telefoon (02508) 3 26

District Zuid-Holland: G. C. Goedschalk, Akeleistraat 148, Den Haag, tel. (070) 68 16 70

District Zeeland: J. van de Walle, Churchillweg 4, Hulst, telefoon (01140) 38 16

District Noord-Brabant: J. C. Vos, Braillestraat 2, Grave, telefoon (08860) 29 78

District Limburg: P. J. Dissel, Hermelsiel 75, Sittard, telefoon (04490) 65 62

## KONTAKTPERSONEN TECHNISCHE KOMMISSIES

W. Mulder, Verwerstraat 39, Deventer, telefoon (05700) 2 36 48

voor tropen, grasparkieten etc.

H. J. Veerkamp, Lorentzlaan 19a, Schiedam, telefoon (010) 15 63 55

voor kleur- en postuurkanaries.

H. Butter, Amstelstraat 60, Beverwijk, telefoon (02510) 3 36 17

voor zangkanaries.

## BONDSBUREAU N.B.v.V.

Aletta Jacobsstraat 4, Bergen op Zoom, postbus 74, gironr. 1148324, telefoon (01640) 3 50 07.

Geopend: 08.00 - 17.00 uur. 's Zaterdags gesloten.

## VERANTWOORDELIJKHEID

De uitgever van dit blad, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van hierin opgenomen advertenties en erkent geen enkele verplichting tot opnemen van aangeboden advertenties.

## LIDMAATSCHAP

Wie als lid van de N.B.v.V. wenst toe te treden, wende zich schriftelijk tot de secretaris van een in zijn plaats van inwoning gevestigde afdeling.

Indien in de plaats van inwoning geen afdeling is gevestigd, kan men zich bij het Bondsbureau als verspreid lid aanmelden. De contributie bedraagt in dit geval f 17,50 per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen.

## ABONNEMENTEN

Bij vooruitbetaling.

Binnenland f 13,— per jaar, bij vooruitbetaling op onze giro 1148324. Buitenland f 15,— per jaar, per luchtpost extra tarief volgens PTT kosten.

België: BFr. 200 per jaar, bij vooruitbetaling op rekening nr. 1560 74 bij het bestuur der postcheka te Brussel 1.

Opgave abonnement bij het Bondsbureau, Bergen op Zoom.

De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publikatie neemt de uitgever geen enkele verantwoordelijkheid op zich.

Het zonder schriftelijke toestemming overnemen van artikelen of gedeelten daarvan is verboden.

## ADRESSEN SPECIAALCLUBS N.B.v.B.

### Nederlandse Zebra-vinkenclub

**Secretaris:** B. L. v. d. Stroom, Mgr. Dr. H. Poelslaan 1, Amstelveen-Bovenkerk.

**Penningmeester:** A. A. Straver, Emmalaan 9, Alphen a. d. Rijn, Postgiro 43984 Coöp. Raiffeisenbank Alphen a. d. Rijn t.n.v. N.Z.C. Contributie f 15,— per jaar. Entree f 5,—.

### Speciaalclub Vorm- en Postuurkanaries

**Secretaresse:** Mevr. M. Th. Paape-van Mourik, Officiersweg 24, Epe Gld. Contributie f 10,—. Entree f 5,—.

### Speciaalclub Eur. vogels en hun hybriden

**Secretaris:** Th. Gietman, Gooiseweg 14, Groesbeek.

**Penningmeester:** J. Landsmeer, Jac. Marisstraat 90, Dordrecht. Postgiro 1580245. Contributie f 12,50 per jaar.

### Speciaalclub voor liefhebbers van insekten en vruchtenetende vogels

**Secretaris:** H. W. Wareman, van Opbergenstraat 20, Rotterdam 14.

**Penningmeester:** W. Ouwehand, Dahliastraat 40a, Rotterdam 25, giro 2625815. Contributie f 15,— per jaar, entree f 5,—.

Inlichtingen, opgave nieuwe leden en betaling contributie uitsluitend aan bovenstaande adressen.

# ONZE VOGELS

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSE  
BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS



Oplage 46.500 ex.

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd  
op 1 juni 1972.

## REDACTIE

C. E. van Berkel

Chr. Walraven

P. Rijnders

Redactieadres: Postbus 74 - Bergen op Zoom

## IN DIT NUMMER

	pag.
Intro	196
De Indische nonpareil	196
Is er nog belangstelling voor de mozaïekkanarie?	200
Wildzang	202
Volières voor tangara's	203
Beplanting in en om de volière	208
Mijn kweek met binsenastrilden	208
Een groentje	210
De standaard grasparkiet	213
Groensnaveltoekans	215
Wat lezers schrijven	221
De zebrevink	224
Wie komt onze geleden versterken?	227
Vogels en antiek zijn geen koopwaar	229
Boekennieuws	232
Neststand gekraagde roodstaart	233
Van alles wat	234

## ADVERTENTIES

Voor advertenties — ook die van leden en  
abonnees — met een zakelijk karakter, zijn  
tarieven en verdere inlichtingen verkrijgbaar  
bij het Bondsbureau van de N.B.v.V.  
Kleine antoncos, voor afdelingen — leden  
en abonnees op „Onze Vogels” van zuiver  
particuliere aard 5 cent per letter met een  
minimum van f5,— per advertentie.  
Zie voor verdere voorwaarden onder „Vraag  
en Aanbod”.

## VRAGEN OVER??

**KLEURKANARIES AAN:** H. J. Veerkamp, Lo-  
rentzlaan 19a, Schiedam.

**ZANGKANARIES AAN:** M. van Woezik, Re-  
gentesselaan 378, Den Haag.

**GRASPARKIETEN AAN:** A. B. J. Braam,  
Casimirstraat 25, Hoensbroek.

**ZEBRAVINKEN, JAP. MEEUWEN EN TRO-  
PENBASTAARDEN AAN:** D. J. v. d. Molen,  
Esschingstraat 80, Dalftsen.

**GROTE PARKIETEN EN BASTAARDEN MET  
KANARIEBLOED AAN:** D. A. Duivis, St. Jo-  
sephstraat 46, Teteringen.

**TROPISCHE VOGELS AAN:** G. v. d. Watering,  
St. Theresiastraat 25, Roosendaal.

## Uitsluitend brieven met betaald antwoord!

## IN DIT NUMMER ADVERTEREN

	pag.
De Gorkumse Molen, Gorinchem	198
Vogelhandel Benny Slagers, Enter (Ov.)	198
M. Steer, Loon op Zand	198
Assurantie- en Hypotheekkantoor Ditters, Uift	198
Cédé Vogelvoeders, Tilburg	198
Van Waardhuizen, Leiderdorp	199
Holley, Delft	199
Beaphar, Raalte	199
Jan D. Kappelle & Zn. Deventer	199
Witte Molen, Meeuwen	207
A. P. van Gils, Goirle	207
Quiko	210
Beaphar, Raalte	210
Van Waardhuizen, Leiderdorp	210
Encia	214
Wirika, Schijndel (N.Br.)	219
V.V.R. Vogelvoederfabriek, Rijswijk-Z.H.	220
Dubriro, Rotterdam	220
N.M.I., Lunteren	220
Bayer Farma, Mijdrecht	223
Veraka, Terheyden (N.Br.)	225
Avimax, Amersfoort	225
Beaphar, Raalte	225
CéDé Vogelvoeders, Tilburg	226
Roupe van der Voort, Den Haag	226
Metaalwarenfabriek Hulskamp, Alkmaar	226
Witte Molen, Meeuwen	228
Geco-Labor, Venlo	228
Blankestijn's Vogelhandel, Veenendaal	228
Roupe van der Voort, Den Haag	230
Koens, Den Haag	231-232
Stuls	236
Vogelhandel Rein v. d. Veen, Goor	239
Animali, Eindhoven	239
Witte Molen, Meeuwen	240

Voorpagina: Indische Nonpareil,  
zie artikel op pagina 196.

Foto: H. Lacey

Ontwerp en druk: Steens N.V., boekdruk/offset,  
Postbus 59 - Schiedam - Telefoon (010) 26 06 40\*



# INTRO

CHR. WALRAVEN

## N.P.C.-N.B.v.V.

De voortdurende tegenstellingen tussen de Nederlandse Parkietenclub en onze organisatie hebben er uiteindelijk toe geleid dat het bondsbestuur genoodzaakt is geweest een minder plezierig besluit te nemen, namelijk de N.P.C. niet meer te erkennen als speciaalclub van de bond. Niet plezierig, omdat het nut van een speciaalclub wel wordt onderkend mits die speciaalclub zich dan ook houdt aan de geldende reglementen. Het is nu eenmaal een onmogelijke zaak om in een organisatie een groepering te hebben die deze regels niet in acht neemt en coûte que coûte verscheidene standpunten stante pede gerealiseerd wil zien. Het streven naar iets kan een goede zaak zijn wanneer men daarbij op zijn minst ook het algemeen belang en in dit geval het belang van de overige 98<sup>3</sup>/<sub>4</sub> procent van de leden wil zien.

In deze zaak was er overigens weinig sprake van alleen het streven naar bepaalde idealen die het N.P.C. bestuur zich gesteld had. Het leek meer een streven te zijn naar het algemeen bindend voorschrijven van enkele bepalingen die men zelf al, onreglementair, had voorgeschreven c.q. toegepast zoals de witte voorfronten en het keuren met alleen een eindpuntentotaal. Men wilde hiervan onder geen beding af.

Los van dit alles blijft het feit dat onze bond reglementen en voorschriften kent die voor maar ook DOOR al haar leden zijn vastgesteld. Deze regels dienen door elk lid te worden nageleefd en wanneer ze niet meer zouden voldoen en gewijzigd dienen te worden beslist de algemene vergadering, in casu de leden daarover. Het bondsbestuur kan en mag niet toestaan dat deze voorschriften en reglementen met voeten worden getreden.

Alle N.P.C. leden zijn van bovenstaande maatregel in kennis gesteld. Om hen niet te dupeeren worden de N.P.C. ringen van hen die dat schriftelijk hebben verzocht voor het komende TT seizoen door de bond erkend voor afdelings-, regionale, nationale en distriktswedstrijden. Zij ontvangen een schriftelijke bevestiging en kunnen deze bij inschrijving van genoemde tentoonstellingen overleggen. De promotie-degradatieregeling zal voor hen worden toegepast op de distriktswedstrijden en daarover volgt nader bericht.

CEVAB

## DE INDISCHE NONPAREIL

### (*Erythrura prasina*)

Wanneer men wat meer te weten wil komen over het gedrag, de broedgewoonten e.d. van de Indische Nonpareil in de vrije natuur, dan komt men al gauw tot de ontdekking dat er in de handboeken maar zeer weinig over deze vogel te vinden is. Het beste wordt dit geïllustreerd met een aanhaling uit het bekende boek van Smythies „The Birds of Borneo”, het gedeelte dat handelt over de Indische Nonpareil sluit hij namelijk af met de wat dramatisch klinkende vragen:

„Where do our birds breed?” (waar broeden onze vogels) en „What are their movements?” (hoe zijn hun verplaatsingen).

Dit alles is wel wat verwonderlijk als we bedenken dat ze in Indonesië veel als kooivogels gehouden worden, zoals beaamd zal worden door de vele vogelliefhebbers die in vroegere jaren in Indonesië gewoond hebben en waarschijnlijk de Bondjolidjou, zoals hij op Java genoemd wordt, daar wel in hun collectie hebben gehad. De Indische Nonpareil is, zodat deze voor de meeste vogelliefhebberdig regelmatig ingevoerd wordt en waarvan de prijs de laatste jaren aardig gedaald is, zodat deze voor de meeste vogelliefhebbers geen bezwaar meer behoeft op te leveren.

Ze komen voor in een gebied, dat zich uitstrekt van Zuid Tenasserim, via Malakka en Sumatra tot Java en Borneo. Ze houden zich vooral op in bossen en in de omgeving van





rijstvelden. Ze schijnen echter niet erg lang op één plaats te blijven, maar rond te trekken op zoek naar voedsel (vandaar ook bovenvermelde vraag van Smythies). Op de rijstvelden kunnen ze flinke schade aanrichten, maar toch is rijst niet hun enige voedsel, ze eten ook gras- en andere zaden en bovendien insecten.

Over de broedgewoonten is maar weinig bekend; van Balen schrijft in zijn boek „Dierenwereld van Insulinde“ dat ze nestelen tussen steenhopen en in rotsholen, ze maken echter ook nesten in struiken.

De kleurenfoto op de omslag van dit nummer geeft een goed beeld van de fraai gekleurde man en het veel eenvoudiger gekleurde popje. De kleurenfoto op deze pagina laat de voorzijde van de man zien en is daarom een uitstekende aanvulling op de voorplaat.

Er is ook een gele variëteit, die men wel Indische geelbuik Nonpareil noemt. Het rood van de buik, de stult en de bovenstaartdekveren zijn bij deze variëteit helder goudgeel en de flanken zijn meer kaneelkleurig. Ook dit zijn bijzonder mooie vogels, die echter maar zelden ingevoerd worden.

Pas ingevoerde vogels moeten met zorg geacclimatiseerd worden. Hoewel ze als ze eenmaal geacclimatiseerd zijn goed tegen koude kunnen — in 1908 verscheen in de „Gefieder-te Welt“ zelfs een bericht over het met succes overwinteren van een paartje Nonpareils in de vrije natuur — hebben ze de eerste tijd veel

warmte nodig, langzamerhand kan de temperatuur dan zakken en bij goed weer kan men de vogels dan in de volière plaatsen. Indien ze in het voorjaar in de volière geplaatst worden, dan zijn ze tegen de winter zodanig aan ons klimaat gewend, dat het mogelijk is ze de wintermaanden in de buitenvolière te laten, mits er natuurlijk een goed nachthok aanwezig is. Het is wel aan te raden om ze bij vorst 's avonds het nachthok in te jagen. Dit is nodig omdat ze veelal in de buitenvolière blijven slapen, ook bij koud weer.

De voeding kan problemen opleveren, maar nodig is dat beslist niet. Meestal zijn de vogels gewend aan ongepelde rijst, de zogenaamde paddy, en het is niet mogelijk ze dan direct te wennen aan het gewone zaadmenu, dit moet geleidelijk geschieden door wat witzaad en later ook gierst en haver door de paddy te mengen en de hoeveelheden hiervan geleidelijk op te voeren. Van groot belang is dat naast het harde zaad ook gekiemd zaad wordt gegeven, dit geldt zeker ook voor de paddy, dit kan men geweekt geven, maar beter nog is het om de rijst te laten klemen door ze gedurende ongeveer 2 weken in niet te koud water te laten staan, waarbij het water dagelijks ververscht moet worden. Nog teveel liefhebbers menen dat men kan volstaan met het enkel maar voeren van zaden, maar Indische Nonpareils moeten ook regelmatig levend voer hebben, vooral als men de vogels pas heeft. Op de eerste plaats komen miereëitjes in aanmerking, deze worden vrijwel altijd gegeten, hetgeen niet het geval is met meelwormen, die de vogels nog wel eens weigeren te eten en die ook beslist niet teveel gevoerd mogen worden, eigenlijk niet meer dan 1 per vogel per dag. Soms eten ze ook wel wat fijn universeelvoer. Verder eten ze ook onkruidzaden en dan met name graszaden, vooral verse. Fruit, zoals appel, peer of banaan wordt ook gegeten en het is aan te bevelen dit enige keren per week te verstrekken. Aan het drinkwater kan wat honig worden toegevoegd en zeker in het begin moet men de vogels vitamine-druppels geven. Als U de vogels op deze wijze verzorgt, dan zal de zo vaak moeilijk genoemde beginperiode maar weinig werkelijke moeilijkheden opleveren. Moeilijkheden en slachtoffers krijgt men pas bij een eenzijdige voeding en uiteraard als de vogels niet gezond zijn als ze gekocht worden.

Broedresultaten kunnen zowel in een ruime kooi als in een volière worden behaald, hoewel de kans op succes in een goed beplante volière aanmerkelijk groter is. Soms wordt in de struiken een vrijstaand nest gebouwd, maar meestal maken de vogels toch wel gebruik van een nestkastje. De pop bouwt het





#### Verspreidingsgebied Indische Nonpareils

nest van de materialen — vooral grasstengels — welke door de man worden aangedragen. De paring heeft in het nest plaats. De 4 tot 5 eitjes worden gedurende ca. 13 dagen afwisselend door man en pop bebroed. De jongen worden grootgebracht met levend voedsel, gekiemd zaad, eivoer en verse onkruidzaden. De oudervogels bedekken de jongen maar betrekkelijk korte tijd en als de temperatuur in de buitenvolière te laag is, gaat het nest al gauw verloren, omdat de jongen van kou sterven, vandaar ook dat vele liefhebbers er de voorkeur aan geven hun vogels binnenshuis te laten broeden, zodat ze de temperatuur in de hand hebben. Na ca. 3 weken verlaten de jonge vogels het nest en 10 dagen later zijn ze zelfstandig.

Met Indische Nonpareils zijn ook reeds bastaarden gekweekt, o.a. met de roodkop-amadine en het zilverbekje.

Indische Nonpareils zijn rustige vogels, die meestal niet agressief zijn en daarom goed in een gemengde collectie gehouden kunnen worden. Het is zelfs wel aan te raden om ze wat levendige vogels als gezelschap te geven, zodat ze tot wat beweging worden gedwongen, daar ze de neiging hebben loom en traag te worden.

Van deze vogels wordt beweerd dat ze niet erg lang in een kooi of volièrre in leven blijven, vele liefhebbers hebben echter reeds ervaren dat dit bij een juiste verzorging beslist niet het geval is.



De nieuwste Amerik. elektr. broedmachine geheel doorzichtig. 40 W., 220 V., met keerinr. en snap-action thermostaat, voor 24 kwartel of 18 kriel of 12 kip of andere eieren. Prima uitk. Ook als kunstmoeder te gebruiken. Folder op aanvraag.

f 84,-

franco huis remb.

**VAN WAARDHUIZEN**

LEIDERDORP - v. d. Valk Boumanweg 204  
Telefoon 01710 - 3 08 37



Voor alle soorten vogels

VERKORT DE RIJ-TIJD  
BEVORDELT DE BROEDRESULTATEN  
VERHOOGT HET WEERSTANDSVERMÖGEN  
HERGEEFT DE VOGELS HUN ZANG EN  
VEDERFRACHT

EEN HOLLEY PRODUCT - POSTBUS 106 - DELFT

VERKRIJGBAAR IN ALLE

dieren - speciaalzaken

## TONIKUM



begunstigt een gezonde ontwikkeling, en voorkomt konstitutionele groeistoornissen, bevordert in het algemeen een kleurrijke vedertool.

**beaphar**  
RAALTE HOLLAND



**Wilt u volop gezonde jongen kweken?**

Geef de oudervogels dan dagelijks **OPFOKVOER „K.O.”**

Licht verteerbaar

Volledig gevitamineerd

Bevat alle bouwstoffen

Ook verkrijgbaar in een samenstelling MET ZUIVER PLANTAARDIG CAROTEEN voor alle roodfactorige vogels.

Verkrijgbaar bij Uw speciaalzaak.

Vraagt gratis monster en folder bij:

Fa. **JAN D. KAPPELLE & ZN.**

DEVENTER - POSTBUS 2 - TEL. 05700-1 39 27

**1e KWALITEIT VOGELVOEDERS**

zangzaad	24,75	per 25 kg
tropisch zaad	19,75	per 25 kg
parkietenzaad	18,75	per 25 kg
krachtvoer	2,10	per kg
universeel	2,25	per kg

Tevens Vogels-Benodigdheden en alle soorten voeders. Orders boven / 100,00 franco door geheel Nederland.

**„DE GORKUMSE MOLEN“**  
Westwagenstr. 65-67, Gorinchem.  
Tel. 01830 - 2 37 15

Fillialen:  
Warmond, Padoxlaan 1. Tel. 01711 - 33 61  
Sliedrecht, Rembrandtlaan 3. Tel. 01840 - 43 47  
Alphen a.d. Rijn, Tolstraat 69

*UW DUURE VOGELS  
HEBBEN RECHT OP EEN  
VOLLEDIG VERANTWOORD  
DIEET:*

**VETTE KORREL**

*EEN 100% DIEET VOOR  
SPREUW- EN  
LIJSTERACHTIGEN,  
MERELS, BEOS, ETC.*

*PRUIS F. 180 PER KG.*

*\*UW WINKELIER HEEFT HET.*



Wij hebben regelmatig voorradig duizenden tropische vogels  
Pracht vinken - Parkieten  
Duiven - Kanaries - Papegaaien  
Blauwkroontjes.  
(Lente papegaaitjes)  
Wij importeren „Quiko“, spec.  
Opfok en Conditievoer voor  
alle vogels!

Vogelhandel „**BENNY SLAGERS**“  
Dorpsstraat 79 - Enter (Ov.)  
Telef. 05478 - 682  
's Zondags tot 2 uur.

Voor fronten tegen zeer scherpe prijzen van fabrikant aan particulier dus beslist nergens goedkoper!

Verder ook alle vogelbenodigdheden zoals drinkbakken, voederautomaten, houten kooien en tentoonstellingskooien etc. — Uitgebreide prijslijst op aanvraag:

M. Steer — Postbus 26 — Loon op Zand.

**PERSOONLIJKE LENINGEN**

en

**VOLIERE-VERZEKERINGEN**

Vogelvrienden wij adviseren U gaarne, in het verstrekken van Persoonlijke leningen en Brandverzekeringen.

Wij verstrakken P.L.'s, voor elk doel ook voor uitbreiding en verbetering Volières.

Bij ons speciale aandacht voor vogelliefhebbers.

Bij ons geen aanvraag-kosten.

Bij ons geen informatie bij Uw werkgever.

Bij ons snelle en geheel schriftelijke afhandeling.

Alle inlichtingen worden U vrijblijvend verstrekt, door

**Assurantie en Hypotheekkantoor**

**DIT TERS**

Deken Nijkampstraat 13 - Uift  
Tel. 08356 - 1906 Lid N.B.v.V.

**NIEUW**

insectenvoer <sup>geel</sup> <sup>groen</sup>  
honingvoer grof  
briljant honing  
universeelvoer populair  
briljant droog  
briljant vet • universeelvoer



**Cédé VOGELVOEDERS**

TILBURG - LANGESTRAAT 104 - TEL. 04250-2556





Agaat.

Foto: W. D. H. Spijker

In vergelijking met het fokken van de verschillende kleurslagen telt de mozaïekkweek weinig aanhangers. De kweker van deze bijzondere kleurvariëteit staat op eenzame hoogte. Enigszins begrijpelijk is dit wel. Er is veel kennis en kunde nodig om een goede mozaïek in de kooi te brengen. Het is beslist geen vogel voor beginners. De echte liefhebber van mozaïeken komt nooit uitgepraat over zijn geliefde vogels. Doch dat heeft hij welgemeen met andere vogelliefhebbers.

Maar juist het soms onverklaarbare inzake de vererving van het mozaïekpatroon, het al of niet geslachtgebonden verervend, het ideale type, het al of niet mogelijk zijn om mozaïekmannen te kweken en nog vele andere problemen, brengt vele tongen in beweging. Niet alleen in Nederland houden de mozaïekliefhebbers zich intensief met deze materie bezig. Ook in het buitenland, vooral Italië en Frankrijk, breekt men zich het hoofd over deze kwesties. Vooral in Italië heeft de mozaïek de harten van de liefhebbers gewonnen. En het moet gezegd worden: ze kunnen er wat van! Wat ons het meeste bezighoudt is de vraag: Is het mogelijk een mozaïek te fokken met een helderwit verenkleed? Sneeuwwit met daarin op de kop scherp gemarkeerde oogteugels. Het stuitkussen zacht doorgekleurd, de borsttekening zo klein mogelijk. En dan de vleugeltekening, ook zo'n probleem. Hiervan eisen we, dat alleen de schouderdekveren, de duimvleugels, doorgekleurd zijn. Dit geeft te kennen dat de grote pennen sneeuwwit moeten zijn. Nu, de eerste mozaïek met vetstofkleurvrije slagpennen moeten

# IS ER NOG VOOR DE

H. J. VEERKAMP

we nog zien. Het lijkt zelfs een onmogelijke opgave om ze in een dergelijke kwaliteit te fokken. Het antwoord hierop zult u verder in dit artikel aantreffen.

Wat wel kweektechnisch mogelijk is, is dat we mozaïeken fokken waarbij de vleugelpennen minimaal vetstofkleur bezitten.

Mijn inziens zou het beter zijn om in de Standaardeisen te spreken van: Vleugelpennen met zo min mogelijk kleur, de schouderdekveren goed doorkleurd, zodanig dat zij een scherp contrast vormen ten opzichte van de slagpennen.

Voordat we verder gaan met de mozaïek enige voorbeelden die nog niets met mozaïek te maken hebben, maar om u een beeld te geven waar we wel mee te maken hebben. Het al of niet bezitten van een baardtekening, in de vorm van twee keelstippen, wordt in de Standaard niet genoemd. En toch zijn er legio



Dom. Wit.

Foto: W. D. H. Spijker



# BELANGSTELLING MOZAIEKKANARIE?

mozaïeken die aan beide zijden van de keel een — spot — bezitten. Over het algemeen is dan de borsttekening ook klein.

De — spots — zouden we kunnen vergelijken met de baardtekening van de agaats. Trouwens de baardtekening is niet alleen aan de agaats voorbehouden. Het is opvallend en lang niet zeldzaam, dat bij heel goede doorgefokte isabelstammen duidelijk een keeltekening te zien is. Isabelstammen die een prima pigmentkleur hebben, maar waarvan de spots, de baardtekening dus, meer naar bruin helt dan naar isabel.

We treffen zelfs isabellen aan waaraan duidelijk is vast te stellen dat zij uit agaats gefokt zijn. Want ook een isabel met een agaatskleurige baardtekening is geen uitzondering. Wellicht is het u nooit opgevallen. Let u er maar eens op. U zult misschien denken, vanwaar deze voorbeelden. Alleen maar om u duidelijk te maken en hierop kan niet dikwijls genoeg geattendeerd worden, dat een factor(en) niet gezien moeten worden als een op zichzelf staande eenheid. Beslist niet, altijd hebben we te maken met onderlinge verhoudingen van de betrokken factoren, zodat er een variatiebreedte bestaat in de soort, die weer op haar beurt wordt veroorzaakt door de beïnvloeding van de factoren, op elkaar. En dan niet alleen de factoren die de pigment en vetstofkleur doen ontstaan. De kleurfactoren die elkaars werking blijv. verbeteren, verminderen, versterken, opheffen of maskeren. Daarnaast de factoren die de lengte van de bevedering regelen. Een korte bevedering laat een scherper kleurbeeld zien dan een lange bevedering die een gedekte tint teweeg brengt. Kortom elke kleurslag staat bloot aan een veelvoud van factorenwerkingen. Zou dit niet zo zijn en alles precies verlopen volgens een vast patroon, dan zou het niet zo'n kunst zijn om showvogels te fokken. Natuurlijk zullen we trachten om zoveel mogelijk de karakteristieke kenmerken vast te leggen die vereist worden bij een zekere kleurvariëteit. En dit is bij elke kleurslag absoluut niet hetzelfde.

de. De verschijningsvorm wordt bepaald door het aantal deelnemende factoren. Het maakt groot verschil of er weinig of veel factoren hun inspraak doen gelden in het kleurtype. Hoe beperkter het aantal deelnemende factoren, des te sneller zullen we komen tot de goede standaardkleur.

Laten we eens enkele voorbeelden nemen. Het is louter en alleen bedoeld om u een inzicht te geven met de moeilijkheden, indien er gewerkt wordt met meerdere kleurbepalende factoren.

Zonder afbreuk te doen aan witte kanaries, zijn dit wel de vogels die de minste moeite geven. De recessief-witte, hoe men hem ook kweekt is altijd helderwit. De grootste kunst is, om hem zo reinwit te houden. Het enige waar we bij deze vogels mee te maken hebben is de recessief vetstofkleurbellettende factor. Uiteraard moet deze dubbel aanwezig zijn.

Een ander voorbeeld is de dominant-witte kanarie. Hier wordt het al iets moeilijker. Het gaat hier niet alleen om een spierwitte vogel te fokken. We zullen ons best moeten doen om een vogel te fokken die geen ontsierende — aanslag — bezit. Echter nog steeds geen bijzondere moeilijkheden waarmee we rekening dienen te houden. Zo zal het kweken van gepigmenteerden wat meer kennis vereisen.

Bekijken we nu eens de zilveragaats. Die dankt zijn verschijningsvorm aan de zwartfactor, de 1ste reductiefactor (opleekfactor) en de wifactor. Door hun onderlinge werking geven zij de kleur aan de zilveragaats. Maar zo eenvoudig als het hier op papier staat is het niet. Want de eis: Minimaal pigment, waarbij de pigmenttekening zo fijn mogelijk moet zijn. Het totaalbeeld moet een heldere indruk geven. Enige vorm van bruin doet de kleurwaarde dalen. Om een helder type te kweken zullen we naast de pigmentfactoren en de wifactor, eveneens een matige intensiteit en blauwstructuur in de vogel moeten brengen.



Dan pas zal het ons lukken een topvogel te fokken.

U begrijpt nu wel, dat in vergelijking met de witte kanaries, om vogels waarbij meerdere factorenwerkingen bijdragen tot één kleurbeeld tot in de perfectie te kweken, al wat meer komt kijken.

Zo zouden we nog meer voorbeelden kunnen stellen. Speciaal heb ik deze genomen om u vooral goed te doen begrijpen dat het fokken van de ene kleur meer kennis en kunde vereist dan de andere. Hoewel dit niet in verband staat met het plezier dat we kunnen hebben van ons eigen favoriete kleur. We vinden dan ook dat de liefhebber die vogels moet houden en kweken die hem het meeste aanstaan. En dat is zeker voor elke liefhebber niet hetzelfde. De ene liefhebber is tevreden als hij een flink aantal jongen in de kooi heeft. 'n Ander rust niet eerder voordat hij in aanmerking komt voor het kampioenschap. Kortom willen we aan de top komen met welke kleur dan ook, dan zullen we moeten specialiseren en van doorzetten moeten weten. Dit is vooral voor de mozaïekkwekers van belang. Een mozaïek is niet een kleurslag waarmee we direct aan de top zitten. Kennis van de betrokken kleur, veel geduld en doorzettingsvermogen zijn beslist onontbeerlijk.

Voordat we een topmozaïek op de keurtafel kunnen brengen is er menig vogeltje gekweekt. Zo sprak ik laatst een liefhebber die het volgende over de mozaïekweek zei: Er zijn vijf jaar nodig om een goede mozaïek op stok te brengen. Van de andere kant zijn er vijf jaar nodig om de mozaïekfactor weg te fokken uit die kleuren waar zij niet gewent is. Dit wil zoveel zeggen als: de mozaïekweek zal streng selectief bedreven moeten worden. Theoretisch is het mogelijk om uit een mozaïekverervende man maal niet mozaïekpop mozaïeken te fokken. Maar dat is dan nog lang niet de mozaïek die we zoeken. Voordat het zover is, moeten we wel andere paringen toepassen. Paringen waarbij we de mozaïekfactor(en) localiseren. Is het ons gelukt om een topvogel te kweken, dan zijn we er nog niet. Om het goede mozaïekpatroon vast te houden is veel overweging nodig. Een verkeerde inbreng van 'n stamvreemde vogel en het spel kan opnieuw beginnen. Veel teleurstelling moet worden overwonnen voordat een stam mozaïeken is gefokt die werkelijk stamkenmerken bezitten. Waarschijnlijk is dit de reden dat de laatste 15 jaar de mozaïekweek in dalende lijn is geweest. De topjaren van de mozaïek zijn wel geweest tussen 1950 en 1955. Er werden toen mozaïeken tentoongesteld die we nu nog maar zelden zien. De teruggang van de mo-

zaïek zal deels ook wel te danken zijn aan de opkomst van de nieuwere kleuren. Hoewel juist in de niet-klassieke kleuren zoals opaal, pastel en ino kunnen heel mooie mozaïeken worden gekweekt. In Italië en Frankrijk zijn we bijzonder gecharmeerd geweest van brons-opaal-mozaïek en de agaast-pastel-mozaïek. Vooral de brons-opaal-mozaïek is iets apart. Prachtig blauwgrijs waarin de orangerode tekening verzonken ligt alsof zij in fluweel is ingelegd.

De agaast-pastel-mozaïek heeft een bijzonder zilvergrijze tint die fantastisch harmonieert met het mozaïekpatroon. De mozaïekliefhebber die dit eenmaal heeft gezien, daarvoor wordt het een uitdaging om ook zo iets te fokken.

Gelukkig heeft een groepje liefhebbers van onze Bond sinds enkele jaren de mozaïekweek ernstig ter hand genomen en nu na 5 jaar, ja u leest het goed, begint het te dagen. Het begint er nu iets op te lijken. Slechts enkele mozaïeken hebben de top bereikt en daar zijn we al heel blij mee.

Misschien dat dit jaar onze moeite beloond wordt. Zodat we in Jan. 1973 op de Wereldkampioenschappen naast de buitenlandse topers ook Nederlandse mozaïeken kunnen bewonderen. Al met al ben ik met mijn hele verhaal nog niet ver gekomen. Doch de volgende maand zullen we een poging doen om de mozaïek in haar totaliteit nader te bekijken.

## WILDZANG

Op 28 november 1970 is een onzer leden door de kantonrechter veroordeeld tot elf gulden boete vanwege het onder zich hebben van een EIGEN KWEEK zanglijster en een keep. Op ons aandringen is dat lid in hoger beroep gegaan en deze zaak diende op 18 oktober 1971 voor de meervoudige kamer van de rechtbank te Breda. Op 28 oktober d.a.v. volgde de uitspraak en deze gaf de mogelijkheid om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan, ondanks het feit dat de basis bijzonder smal was. Er was maar op een enkel punt van het verweer van onze verdediger ingegaan. Niettemin is er toch een zo uitgebreid mogelijke schriftuur van cassatiemiddelen samengesteld welke op 4 januari 1972 door de Hoge Raad is behandeld. Op 10 maart ontvingen wij bericht dat genoemd rechtscollege de zaak had verworpen. Het arrest is nog niet in ons bezit. Na bestudering daarvan zullen wij nog nader op deze zaak terug komen.



# VOLIÈRES VOOR TANGARA'S

J. Ingels

Tangara's vormen werkelijk een groep van geschikte vogelsoorten voor een grote beplante binnenvolière. De schade aan een robuuste beplanting is te verwaarlozen. In dat opzicht is elke serre een ideale binnenvolière. De beplanting groeit meestal snel en weelderig, en herstelt zich gemakkelijk. In een serre kan men ook gemakkelijk een echte tropische atmosfeer scheppen, waarin tangara's zich werkelijk prima voelen. In een gesloten volièrre kan men ook veel gemakkelijker (vliegende) levende insecten voederen, omdat dit levend voer minder gemakkelijk kan ontsnappen. Als binnenvolière biedt een serre echter een paar niet te verwaarlozen, maar oplosbare nadelen. In de winter moet men erg goed doorstoken, om een gemiddelde temperatuur van 15°—18°C te bereiken. Glas en allerlei soorten plasticplaat zijn slechte isolatoren, en geven gemakkelijk de voortgebrachte warmte af. Met een beschuttende (eventueel dubbele) laag rietmatten, ook langs het mogelijk opstaande glasgedeelte heen, kan men een tamelijke isolatie bereiken. Het warmteverlies vermindert nog, indien de volièrre bovendien in een windstille omgeving staat (bv. in een binnentuin). In de zomer daarentegen kan bij zeer warm weer, de temperatuur in de binnenvolièrre hoog oplopen. Een openstaande verbindingsdeur naar de buitenvolièrre brengt dan bv. reeds enige verbetering. De rietmatten, die we 's winters als isolatie gebruiken, kunnen we nu bovendien gebruiken om de te felle zonnestralen te weren uit onze binnenvolièrre. Verder kan men het glazen of plastic dakoppervlak besprenkelen met een mengsel van een speciaal soort krijt in water, dat daarna vlug opdroogt en dan de meeste zonnestralen weerkaatst. Bij de bloemisten is dit een veel gebruikte methode, om de serreplanten tegen de felle zonnestralen te beschermen. Wanneer men regelmatig de beplanting besproeit ('s morgens en 's avonds bv.), dan werkt dit beslist ook verfrissend.

Tangara's zijn relatief kalme vogels en ze zullen zichzelf dus niet kwetsen door tegen de glazen wanden van de volièrre aan te vliegen. Bij het inbrengen van nieuw aangekochte vogels moet men echter oppassen; ze zullen gemakkelijk opschrikken en door het glas trachten te ontkomen. Dit probleem kan men eenvoudig oplossen door „gehamerd”

glas te gebruiken, waardoor de vogels de neiging verliezen om door het glas te willen wegvliegen. Indien men bovendien via een gebroken ruit niet al zijn tangara's wil verliezen, dan moet men als voorzorgsmaatregel bij een serrevolièrre zeker dubbel glas of een draadbescherming langs het glasoppervlak aanbrengen. Gegolfd plastic scheurt en breekt gewoonlijk zonder gaten te geven. Daarom kan men zo'n dakbedekking bv. onbeschermd laten.

Het zomerprobleem van een te warme binnenvolièrre is voor 90% opgelost, wanneer men een buitenvolièrre tegen de binnenvolièrre aanbouwt. Op die manier kan men z'n tangara's bovendien zelf laten kiezen tussen de binnen- of buitenvolièrre. En voor warme zomerse dagen en nachten is een buitenvolièrre, liefst beplant, een ideaal vogelverblijf. Een echte vogelliefhebber, die over de ruimte en de mogelijkheden beschikt, zal werkelijk een beplante buitenvolièrre willen aanleggen.

Tangara's zijn werkelijk fantastische bewoners voor een beplante buitenvolièrre. En indien het aantal vogels niet te hoog ligt en de beschikbare ruimte niet te beperkt is, lijdt de beplanting echt niet te erg onder de aanwezigheid van de tangara's. Alleen in een te kleine volièrre durven ze wel eens uit verveeling en uit nieuwsgierigheid aan het vernielen gaan.

Een buitenvolièrre bouwt men het makkelijkst tegen de binnenvolièrre aan. Daardoor heeft men onmiddellijk een afgeschermd gedeelte voor gure dagen. Maar een buitenvolièrre kan men ook los op zichzelf, in de tuin optrekken. Liefst kiest men dan een hoekje uit, dat enigszins beschut ligt tegen slagregens uit het westen of koude noorderwind. Desnoods kan men aan de wester- en noorderkant buiten de volièrre, een scherm van ingetopte kaarspopulieren aanleggen, waardoor wind en slagregen gebroken worden. Of men kan ook de beplanting in de volièrre zelf schermvormig aanplanten, waarbij de grootste struiken en boompjes aan de noord-westelijke zijkant moeten staan. Ook rietmatten, bamboevlechtwerk of stevige plasticplaten kunnen als bescherming tegen te gure weersomstandigheden, aan de zijanten van de buitenvolièrre aangebracht worden. Het probleem om een zekere afscherming te krijgen is natuurlijk vlug opgelost, als men een buitenvolièrre kan



bouwen tegen één of meerdere vaste muren. Een dergelijke muur biedt trouwens een fantastische mogelijkheid om klimplanten aan te planten (klimop bv.), waar vele soorten tangeras (en vooral organisten) graag nesten in zullen bouwen.

Een buitenvolière mag niet te klein en vooral niet te laag zijn. Men biedt elke vogel liefst zoveel mogelijk m<sup>3</sup> aan, waarbij de minimum-



*Een algemeen beeld van de begroeiing in de buitenvolière*

ruimte per vogel zeker rond 1,50 tot 2 m<sup>3</sup> ligt. Een grote buitenvolière is trouwens ook voordeliger voor de beplanting.

De materialen die men bij de konstruktie van een buitenvolière aanwendt, neemt men liefst tamelijk stevig en van een duurzame kwaliteit. Een houten gebinte behandelt men best met een goed anti-verrottingsprodukt, en een konstruktie van ijzeren buizen (gas- of waterleidingsbuizen bv. zijn zeer goed bruikbaar) moet men met een roestwerende verf behandelen. Vooral in industriegebieden roest het volièregaas zeer vlug weg. Daarom kan men beter het gaas ook zwart verven, waardoor het geheel langer meegaat en de „doorkijk-zichtbaarheid“ aanzienlijk verhoogt. Donkergroen geplastificeerde volièredraad is natuurlijk „de“ ideale oplossing, die echter nogal duur uitvalt.

Een gemakkelijk en vlug gebouwde buitenvolière krijgt men ook, wanneer men nylonnetten gaat gebruiken. Op een dergelijke wijze, kan men zeer grote oppervlakten (bv. 20 x 20 m<sup>2</sup>) met een volièrè overdekken. Voor zo'n volièrè voorziet men stevige met normaal metalen gaas beklede zijwanden. Het dak bestaat dan uit het enorme nylonnet, dat ondersteund wordt door een stel kruisvormig gespannen draagkabeltjes. Deze met plastic beklede draagdraden spant men het best op 1 meter afstand van elkaar, in twee richtingen loodrecht op elkaar. Het nylonnet wordt daarna uitgerold op dit draagvlak, en na de-

gelijk opspannen aan de zijanten vastgemaakt. Het nylonnet moet beslist goed opgespannen worden, zodat bij winderig weer, het net niet gaat „golven“. Door die voortdurende op- en neergaande beweging, zal het nylonnet nl. overal tegenaan schuren, en doorslijten. Het net moet dus zo goed mogelijk geïmmobiliseerd worden. Een echte vijand van nylon (van de meeste synthetische stoffen, zoals bv. plastics, trouwens) is het ultraviolette gedeelte van het zonlicht. Onder inwerking van het ultraviolette licht, zal het nylonnet na een paar zomers bros worden waardoor breuken en scheuren zullen ontstaan. De oplossing voor dit probleem ligt in het beschermen van het nylonweefsel met een zwarte deklaag. Daarvoor moet men het opgerolde net, onderdompelen in een goed vloeibaar mengsel van creoline en bitumen of teer. Dit werkje kan men in een groot metalen vat uitvoeren, waarbij het opgerolde net aan een draagstok hangt, zodat men het gemakkelijk kan verhandelen om te laten uitlekken en drogen.

Een dakbedekking van nylonnetten, biedt geen weerstand aan knaagdieren, maar een stevig soort nylonvlechtwerk is wel bestand tegen katten en roofvogels. Een dergelijke volièrèbedekking kan men 's winters verwijderen, waardoor de noodzaak van een stevige dakkonstruktie om het instorten van de volièrè bij hevige sneeuwval tegen te gaan, wegvalt. Alhoewel een dergelijke konstruktie, afhanke-



*Een beeld van een dichtbegroeide hoek van de buitenvolière*



lijk van de sterkte van de opstaande wanden en de draagdraden, weerstand biedt aan 10 tot 15 cm sneeuw. Voor de zijwanden mag men nooit nylonvlechtwerk gebruiken. De vogels raken te gemakkelijk verward in het soepele vlechtwerk, en komen daarbij soms om.

Een buitenvolière moet een minimumhoogte van 2 tot 2,50 m hebben. Beter kiest men een hoogte van 2,75 tot 3 m, of nog hoger. Zo'n volière kan men dan beplanten met een paar boompjes en grote sierstruiken. Die beplanting moet vooral niet duur zijn, daar onze inlandse wilde heesters en bomen beter groeien in een volière. Berken, wilgen, elzen en bremstruiken bv., kan men op bijna elk stuk braakliggende grond aantreffen en ze vormen een ideale volièrebepanting. Dergelijk struikgewas groeit vlug, en men mag ze daarom ieder jaar flink snoeien, zodat ze niet door het gaaswerk heen groeien. Want de vogels kunnen dan te dicht tegen de volièredraad gaan slapen, waarna ze door een handige kat door het gaas heen worden gehaald. Verder kan men allerlei boompjes en heesters die men bij een boomkweker krijgen kan, in de buitenvolière aanplanten. Met taxus- en ligusterstruiken, flink ingesnoeide populieren en allerlei sierheesters, kan men een smaakvolle beplanting aanleggen. Men moet er zich echter toch van vergewissen of een bepaalde heester niet schadelijk is voor de vogels, of giftige bessen draagt.

Het struikgewas in een volière moet men elke lente flink insnoeien. Daardoor belet men dat de volière werkelijk openbarst van het groen, en men kweekt bovendien een dichte begroeiing, waarin de vogels bescherming kunnen zoeken tegen regen, wind en zon. Bovendien biedt men de vogels op die manier prima afgeschermd slaapgelegenheden. En vooral taxus- en ligusterstruiken worden door tangara's graag als nestplaatsen uitgekozen. Het fijne takwerk geeft een goede steun aan de meestal nogal „slappe” nestjes.

Het geheel van de beplanting moet zo mogelijk „tribunvormig” worden uitgevoerd. Tegen de verste zij- of achterwanden van de volière, plant men de hoogste boompjes en struiken, en men zorgt dat de kortste heesters vooraan komen te staan. Daardoor houdt men goed overzicht over de volière, en men imiteert enigszins een woudrand of een open plek in het oerwoud, waar tangara's zich thuis kunnen voelen. Een kleine vijver of een ondiepe eternitschaal op de open plaats, biedt een goede badgelegenheid. Daar de vogels ook zullen drinken van dit badwater, moet men het water regelmatig verversen en er voor zorgen dat er geen uitwerpselen in kunnen vallen. Vooral de uitwerpselen van

wilde vogels (mussen!) die op het dak van de volière rondlopen, zijn erg gevaarlijk. Deze vreemde bezoekers zijn dikwijls verantwoordelijk voor het overbrengen van allerlei ziekten (vogelchoiera en -tuberculose bv.).

Naast de overblijvende beplanting, kan men ook allerlei eenjarige en overblijvende bloemen in de volière planten. Vooral vroegbloeiende bolgewassen (krokussen en tulpen bv.) geven goede resultaten. Hun bloemen verschijnen nog voor de beplanting dicht bebladerd is, wat een fris lente-achtig effect geeft. Bovendien vormen de droge krokusbladeren later een uitstekend nestmateriaal. De beginnende lente is ook een gevaarlijke



*De randbegroeiing van een open plek vooraan in de buitenvolière*

periode voor de beplanting zelf. Alle planten, struiken en bomen geven dan nieuwe jonge scheuten en blaadjes. En dat jeugdige groen wordt door tangara's meestal uit nieuwsgierigheid nogal eens afgeplukt. Vooral de jonge knoppen van de wilgesoorten, die altijd makkelijk groeien in de volière en ideale „zitstruiken” vormen, vallen bijzonder in de smaak. De fijnere takjes, waarvan het jonge groen is afgetrokken, sterven meestal af i.p.v. nieuwe knoppen aan te maken. Een mooie wilde wilg kan daardoor na één seizoen erg toegetakeld zijn, alhoewel tangara's het uitgegroeide groen met rust zullen laten.

Wanneer men enkel maar tangara's gaat houden, en men wil ook kweekresultaten behalen, dan kan men beter één grote gemeenschappelijke buitenvolière (bv. 6 x 6 m<sup>2</sup>) en verscheidene kleinere daarbij aansluitende buitenvolières (bv. 2 x 3 m<sup>2</sup>) oprichten. Indien men een koppeltje heeft of denkt te hebben dat aan broeden toe is, dan kan men het paartje uitvangen uit de grote voliè-re en onderbrengen in een kleinere buitenvolière, waar ze dan rustig kunnen kweken. Mochten deze kleinere volières niet voorzien zijn van een bijbehorende binnenvolière, dan





*Een nestkastje tussen de begroeiing tegen de binnenvolière opgehangen.*

kan men toch beter bovenop en achteraan een bescherming aanbrengen, zodat de tangara's niet steeds in elk weertje moeten buiten zitten. Gegolfde plasticplaten en rietmatten zijn daarvoor geschikt, maar ze moeten wel stevig aan de volièrekonstruktie worden vastgemaakt, zodat ze aan een stormweer kunnen weerstaan. Ook de pas uitgevlogen jongen zullen er misschien gebruik van maken, alhoewel ze langdurig regenweer best verdragen, als ze maar een dichte begroeiing ter beschikking hebben.

Een buitenvolière kan slechts ongeveer 5 maanden (mei—september) intensief gebruikt worden, maar ze speelt dus toch een bijzonder belangrijke rol bij het houden en kweken van tangara's. De vogels kunnen bovendien genieten van de rechtstreekse zonnestrallen en van regenbuien, wat hun gezondheid bepaald ten goede zal komen. En vooral de levende insecten die door de vogels kunnen worden gevangen, betekenen een welkome voedselaanvulling.

De volièrebegroeiing moet men regelmatig besproeien om o.a. het stof en het vuil te verwijderen. Op warme dagen kan men beter elke dag sproeien. Tangara's vinden het fijn, om door het natte gebladerte rond te fladderen. Een goede oplossing vormen een paar vast opgestelde sproeikoppen, die door ondergrondse buizen met elkaar verbonden zijn, en waarop men een tuinslang kan aansluiten, zodat men een bijna natuurlijke regen krijgt. De beplanting zal niet alleen beter groeien, maar er ook steeds frisser uitzien. De uitwerpselen van de vogels spoelt men op die manier zoveel mogelijk naar de bodem toe. Indien men bovendien elke winter de volièrebodem even omkeert, dan heeft de begroeiing ook nog wat aan datgene wat op de grond achterblijft, zoals droge bladeren, uitwerpselen ed. Een volièrebodem, die kan

„uitwinteren" raakt op die manier ook enigszins gezuiverd van gevaarlijke (besmettelijke) organismen. Voedsel kan men beter in de binnenvolière aanbieden, maar soms moet het wel in de buitenvolière. Dan geeft men alles op een klein tafeltje, liefst in de schaduw van de struiken, om het uitdrogen door de zomerwarmte zoveel mogelijk te vermijden. Zoet voedsel en fruit zullen wel bijen en vliegen aantrekken, maar daar valt weinig aan te veranderen, alhoewel vliegen bv. ziektekiemen kunnen overbrengen.

Tangara's plukken ook graag vruchten „rechtstreeks" van de boom. Van kerseboomen bv. kan men hele takken met rijpe kersen afzagen en in de buitenvolière in een ingegraven emmer water zetten. Ideaal zouden natuurlijk speciale volières zijn, waarin men eerst allerlei bessen en vruchten laat rijp worden, waarna men de vogels in de volières binnenlaat. Cotoneaster- en sorbus-soorten zouden zich tot een dergelijk experiment (bijv. lijsterbessen) en allerlei fruitbomen, goed lenen.

Een echte vogelliefhebber zal zich bij het inrichten van z'n volières, door zijn eigen opmerkings- en bedenkingsgave laten leiden, en ook zelf allerlei zaken uitproberen en moeilijkheden oplossen. Maar wanneer men nog aan het bouwen van een volièrè moet beginnen (andere liefhebbers kunnen er ook nog wel wat uit leren!) dan mag men zeker niet nalaten om even de artikelenreeks over „De volièrè" te lezen, die geschreven werd door C. E. van Berkel en die begonnen is in het oktobernummer '70 van „Onze Vogels" Want in het opbouwen en verwezenlijken van een „ideale" volièrè als leefomgeving voor zijn vogels, schuilt een gedeelte van de vreugde die elke liefhebber aan het houden en vooral kweken van prachtige en relatief zeldzame vogels, zoals tangara's bv. beleeft.





# DUPHASECT

een volkomen veilige  
spray voor uw vogels!

De ontwikkeling van beter en veilige producten voor vogels staat niet stil.

Het voorkomen en bestrijden van vogelluis, mijt en andere parasieten is een eerste vereiste om een maximum aan fokresultaten te behalen.

DUPHASECT een betrouwbaar en veilig middel.

Bij normale toepassing onschadelijk voor dieren en materiaal.

DUPHASECT de spray met het toelatingsnr. 5782 N.

Voorkom teleurstellingen in de kweek, maak gebruik van dit nieuwe en veilige product.

DUPHASECT een Philips Duphar product.

Alleenverkoop voor Nederland Witte Molen Meeuwen (N.B.)



witte molen



**A. P. VAN GILS**

**ORANJEPLEIN 21 - GOIRLE (HOLLAND)**

**TELEFOON 04247 - 15 79**

**VOGEL- EN DIERENHANDEL**

Gloster Kanaries, Borderkanaries, Yorkshire-kanaries, Norwich-kanaries, Gele Man- en Pop-kanaries, Diamantvinken, Bichonows, Binsen, Gould-amadines, Spitsstaartamadines, Cerus, Driekleurpapegaaiam., Parelhalsbandamadines, Rodedruppelestrilden, Kwartelastrilden, Abbesijnse geelb. astr., Angola Blauwfazantjes, Indische Nonpareils, Mex. Nonpareils, Rode Kardinalen, Blauwoogbulbuuls, Groene Kuifbulbuuls, Irenabulbuuls, Roodoorbulbuuls, Witte Rijstvogels, Grijs Rijstvogels, Japanse Nachtegale man en pop, Oranje-wevers, Blauwfazantjes, Bandvinkjes, Staalvinkjes, Goudmussen, Grote Oostafrikaanse Blauwfazantjes, Edelzangers geelstuit en gewone, Dubbele Mozambiquesijsjes, Mozambiquesijsjes, Mandarijn-eendjes, Carolina-eendjes, Krielkipjes, Goudfazantjes, Roodrug parkieten, Bourks, Turquosines, Elegant, Prachtrosella's, Stanly, Blaskop, Fisheries, Personatas, Geelnek-widah's, Kleine Beo's, Japanse Kwartels wit en bruin, Valkparkieten, Deens bonte en Grasparkieten, Diamantduifjes, Zilverdiamantduif, Brillant, Schubbeduifjes, Shamalijsters, Goudvoorhoofdbladvogels, Grijs roodstaartpapegaaien, Groene papegaaien, enz. enz. Regelmatig hebben wij nieuwe soorten vogels in voorraad.

Wij vragen Australische Vinken, Parkieten, Kleurkanaries enz.

Winkels in vogels krijgen bij ons een aanmerkelijke korting.

Geopend dagelijks van 10 tot 12.30 en van 1.30 tot 5 uur. 's Zondags van 10 tot 12 uur. Verzending onder rembours, kistje tegen / 2,50 per stuk.



## BEPLANTING IN EN OM DE VOLIERE

### Boomwurger

Om de vaak strakke vorm van de volière een wat natuurlijker aanzien te geven en meer in de tuin op te nemen, zou op 1 of meer plaatsen het gaas begroeid kunnen worden door een klimplant. Een goed groeiende mooie klimplant is de boomwurger (*Celastrus orbiculata*). Hij heeft een breed ovaal blad en groeit met lange windende stengels. Hij bloeit in juni met onopvallende bloemen, maar in oktober draagt hij mooie geel-oranje gekleurde besachtige vruchten. Om vruchten te kunnen krijgen moeten wel mannelijke en vrouwelijke planten worden geplant. De herfstkleur is prachtig geel. De boomwurger verlangt een niet te natte plaats op een liefst wat zandige grond.

Een ander soort met een wat groter blad is de *Celastrus scandens*. Deze groeit nog iets sterker en kan ook hoger worden, maar geeft minder rijk vruchten.

Uit: Onze Eigen Tuin, Amstel 157 te Amsterdam.



Mijn kweek met.....

## BINSENASTRILDEN

In mijn volière die bevolkt is met zebravinken, goudbuikjes, st. helenafazantjes, napoleonnetjes, tlijgervinkjes en Japanse meeuwtjes, zitten sinds vorig jaar een span Binsenastrilden.

In maart van dit jaar heb ik de nestkastjes opgehangen in mijn geheel beschutte volière. Enkele dagen later hadden de binsen hun nestje klaar, nog eerder dan de zebravinken, die anders altijd het eerste klaar zijn. Toen ik na een week de nestkastjes inspecteerde zag ik twee eitjes liggen in het binsennest en het bleek dat ze al met broeden waren begonnen. Weer dertien dagen later merkte ik aan het gedrag van de Binsen dat er jongen moesten zijn. Ze aten veel meer dan anders, waarbij mij opviel dat de éne bins veel in water geweekt oud wittebrood at en de andere een grote voorkeur aan de dag legde voor gekiemd zaad. Ik verstrekte ook overvloedig maïs in zaad en daar waren ze ook

verzot op. Het opfokvoer dat de zebravinken aan hun jongen geven raakten de binsen niet aan. Toen de jongen ongeveer een week oud waren, merkte ik op een morgen dat er een Japanse meeuw in het nest van de Binsen zat. Ik vreesde dat er iets niet in orde was en besloot te gaan kijken. Tot mijn grote vreugde zong ik vier mooie jonge binsen liggen met goed gevulde kropjes.

Toen ik de volière verlaten had ging één van de binsen direct weer op het nest. Even later volgde de Japanse meeuw zijn voorbeeld en ik kon duidelijk zien dat ze beiden aan het voeren waren. Later zag ik ook wel weer beide binsen op het nest en was de Japanse meeuw ergens anders.

Dit ging zo een dag goed, maar de volgende dag merkte ik dat de man bins het nest niet meer in mocht. De Japanse meeuw (die een man bleek te zijn) zat prinsheerlijk naast de pop bins in het nest met de jongen. Dit nam



pa bins echter niet, en toen de Japanse meeuw zich op een gegeven moment van het nest verwijderde om een hapje te eten kwam pa bins in actie. Hij ging in de nestkast en haalde een jong uit het nest. Ik zag dit alles gelukkig, maar toen ik in de voliëre kwam liet de man net het jong vallen. Ik pakte het vlug op, het leefde nog, ik heb het bij een span Japanse meeuwen gelegd die net hun nest klaar hadden. Gelukkig zag ik een paar dagen later dat het jong nog leefde en goed gevoerd werd.

Vanzelfsprekend heb ik de man Japanse meeuw die het binsennest verstoord had, uitgevangen. Ik had het geluk dat ik hem goed herkennen kon doordat hij één witte vleugelpen had.

De binsen zorgden nu weer samen voor hun kroost, maar op een koude nacht toen ze niet meer op hun jongen sliepen en er nachtvorst kwam waren 's morgens alle jongen dood, ze lagen met nog voer in de kropjes dood in het nest.

Toch had ik nog weer geluk bij ongeluk want het jong bij de Japanse meeuwen leefde nog, de Japanse meeuwen gingen 's nachts niet bij het jong weg. Toen het jong al drie weken oud was heb ik het pas kunnen ringen, ik had het al eerder geprobeerd, maar telkens ging de ring er weer af. Maar nu na drie weken was het pootje zo gegroeid dat de ring zitten bleef. Toen het jong 4 weken oud was vloog het uit, ja, uitvliegen kon je het eigenlijk ook niet noemen, zo onbeholpen ging het allemaal.

Maar een paar dagen later ging het al veel beter en vloog het al van de éne zitstok naar de andere. Het jong is bruinachtig van kleur en lijkt nog niets op zijn knappe ouders, maar ook dat is een kwestie van geduld.

Ik ben al lang blij dat ik mijn eerste eigenkweek binsenastrilde op stok heb. Nu ik dit stukje schrijf hebben de oude binsen juist wéér jongen gekregen. Ik hoop nu dat ze deze dit keer zelf kunnen grootbrengen, dat is hun van harte gegund na alles wat ze hebben moeten doormaken.







## OPFOK- EN CONDITIEVOER

voor  
Kanaries- Parkieten-Exoten!

„Beslist Beter“

Vraag uw leverancier naar Quiko!

Imp. voor Nederland:  
fa. Borgonjen 05730-2748  
fa. Slagers - 05478- 682

## DEX-CI-CO



**beaphar**

RAALTE HOLLAND

een Insektenmiddel, enig in de vogelwereld, bevat geen kontaktvergif en is voor mens en huisdieren absoluut onschadelijk, zonder risico te gebruiken.



Amerik. elektr. broedmachientje voor 18 kwarteleitjes of andere, met handleiding.

**f. 28.-**

Incl. BTW  
franko remb.  
Vele dankbetul-  
gingen.

## VAN WAARDHUIZEN

LEIDERDORP - v. d. Valk Boumanweg 204  
Telefoon 01710 - 3 08 37

*ONZE DURE VOGELS  
HEBBEN BEHOEFTE AAN*

### **VETTE KORREL**

*GESCHIKT VOOR  
INSECTEN- EN  
VLUCHTEN-ETENDE  
VOGELS*

*ZOALS SPREEUWEN,  
LUISTERS, MERELS,  
BEO'S ETC.*

*PRUIS f. 180 PER KG.*

*\* UW WINKELIER HEEFT HET.*

## EEN GROENTJE

Het is in 1967 begonnen. M'n broer had net zolang gepraat, dat ik een gróte kooi ging kopen. Hij zorgde voor een felgeel popje en een man van een kleur waar hij geen naam voor wist en ikzelf uiteraard helemaal niet.

Ik had dat jaar meteen succes, want ik fokte negen jonge kanaries. Ik kreeg de smaak te pakken; ging boekjes kopen en overal m'n licht op steken.

Het eerste, dat ik meende te begrijpen, was dat er gewone kanaries bestonden en kleurkanaries. Kleurkanaries waren voornamer dan zómaar-kanaries. Die van mijzelf waren zómaar-kanaries, al waren ze wel prachtig felgeel gekleurd. Ik voerde allerlei onkruidzaden. Dat was erg goed werd me verteld en het stond ook in mijn boekje.

Toen kwam de rui en toen kreeg m'n man langzamerhand een steeds duidelijker oranje kleur.

Ondertussen was ik wel erg nieuwsgierig geworden naar wat nu „kleurkanaries waren“. Een goede geest heeft me toen aan het verstand gebracht, dat kleurkanaries ook wel pigmentkanaries genoemd werden. En toen, na nog veel vragen, kwam de grote verblijvende openbaring, dat mijn zómaar-kanaries ook heuse kleurkanaries waren, maar géén pigmentkanaries. Dat waren de sjeke kanaries, met streepjes en schimmel en dan nog dat geheimzinnige pigment in hun veren.

Ik vond, dat ik toch eens „pigment“ moest gaan zien en ging eens een kijkje nemen op een „vogeltentoonstelling“ in een naburig dorp. En daar waren ze, hé! Pigmentkanaries!

Ik stond wel vreemd te kijken van al die verschillende kleuren, maar het meeste spul vond ik voorlopig nogal erg musserig. Mijn eigen gele kleurkanaries waren tenminste kleurkanaries.

Maar bij het verlaten van de tentoonstelling werd ik opgevangen door iemand van de club die de tentoonstelling organiseerde. Hij was o.a. ringencommissaris. Een titel om meteen eerbied voor te krijgen. Nou... en toen tuinde ik er in. Met mijn elf kleurkanaries werd ik lid van de club. Ik ben die „ringencommissaris“ nog steeds heel erg dankbaar en mijn eerbied is er niet minder op geworden, want nu weet ik, wat dat betekent. Ik geloof dat we voor hen, die dat baantje voor hun club opknappen, wel enige waardering mogen hebben.

Maar ja, ik vond dat ik nu toch ook wel pigmentkanaries moest zien te krijgen, al was

JSSSEL

De



ik nog wel erg een „groentje“ in het vak.

Wel, die eerste pigment-kanarie (magische naam, vol onbekende verrassingen) die ik kreeg, dat was een „groentje“.

Nu heb ik vanaf het begin van mijn hobby aantekeningen gemaakt. Zodoende kan ik de ontwikkeling op de voet volgen.

Mijn eerste pigmentkanarie werd door zijn eerste eigenaar aldus gekwalificeerd: „Het is groen-agaat; meer zilver dan isabel.“ Nu, dat was voor mij erg duister toen.

En nu na vier jaar ijverig studeren over alles wat met vererving te maken heeft, is het nog niet veel minder duister geworden. Ik kon er het best maar een goud-agaat pop bij kopen. En dat deed ik.

Mijn hoge verwachtingen van mijn kostbare pigmentkanaries werden echter de bodem ingeslagen. Na drie legfels, met soms jongen die een paar dagen leefden, maar dan weer stierven, was ik niets opgeschoten, maar ik had wel veel geleerd van mijn eigen stomiteiten. Gelukkig deden mijn gele vetstofvogels (die naam had ik inmiddels ook aangeleerd) het erg goed.

In 1969 paarde ik mijn groene man aan een goud-isabel popje. Ook nu weer was het resultaat niet daverend. Aan het einde van het seizoen, vijf jongen van dit kweekstel, waaronder een grauwoegroen popje met ontzettend veel bruin in de rug. Ik wist toen nog niet, dat dat bruin aan de schoonheid van zo'n dame grote afbreuk doet. Ze had uit een ander legsel een goud-groene broer overgehouden en samen gingen ze voor het eerst naar de clubtentoonstelling. De heer E. Adema had in het augustusnummer van „Onze Vogels“ een pleidooi gehouden voor het opnieuw gaan kweken van de bijna verdwenen goud-groene kanarie en het plaatje erbij was zo schitterend, dat ik me had voorgenomen me als pionier voor de goud-groene op te werpen.

De grauwoegroene pop haalde 84 punten, met de opmerking: „Veel te veel bruin in de rug. Pigment te grof.“

De goud-groene kreeg 85 punten, met als aanwijzing: „Pigment te grof. Aanslag aan de vleugels; flanken en broek te licht.“

Wist ik, wat een broek was bij een vogel? Ik zocht hem wel zo ongeveer in de buurt van waar de mijne pleegt te zitten, maar gelukkig hielpen clubleden mij uit de droom.

Gelukkig had ik met een ander stel pigmentkanaries veel betere resultaten en lieten mijn oude trouwe zomaar-vetstofvogels me niet in de steek.

Maar toch wilde ik m'n plan om goud-groene kanaries te kweken niet laten varen. Ik had ondertussen uit de „Handleiding voor de kanariekweker“ begrepen, dat mijn goud-groene

man een passe-partoutman moest zijn. Ook al weer zo'n magisch woord.

Die paarde ik aan een goud-isabel pop en...? Vol verwachting klopt ons hart!

Inderdaad kwamen de meest uiteenlopende kleuren te voorschijn, maar er was slechts één grauwoegroene man bij en een goud-groen popje, dat zó intensief was, dat het ten dode opgeschreven scheen. Het wilde niet door de jeugdruï komen en ik heb vaak overwogen het arme dier maar dood te maken. Toen ik het echter in een verwarmd vertrek haalde kwam het langzaam beter in de veren, al bleef het een miezerig ratje. Het had echter erg zwarte pootjes en erg fijne pigmentstreepjes.

Voor die veel te bruine grauwoegroene pop had ik een zilverbruine man gekocht, die pastelverervend moest zijn.

In ons lijfblad had ik nl. gelezen, dat je op die manier soms heel goede bruine vogels kon kweken. En „Onze Vogels“ kreeg gelijk. Op de tentoonstelling kreeg een zilverbruine pop 89 punten en een tweede haalde 88 punten, samen met een zilverbruinpastel popje.

De beide groene aanwinsten stuurde ik maar niet meer in. Maar ondertussen had er in het augustusnummer van 1970 weer een artikel over de goudgroene kanarie gestaan, van de hand van de heer W. D. H. Spijker, met weer een prachtig plaatje erbij. Als u kunt, moet u die beide afbeeldingen eens met elkaar vergelijken. In dat artikel staat de kreet: „Kom fokkers, wie zet hier zijn schouders eens onder?“

Dat intrigeerde mij en toen ik op de grote tentoonstelling in Groningen goudgroene vogels zag met 88 punten op hun keurbriefje, was ik er gewoon niet bij weg te slaan. Ze hadden de kleur, die het meest overeenkwam met de afbeelding van het nummer van 1970. Maar ja, ik was wat groen betrof in ieder geval zelf nog een groentje, dus...

Toen kwam er een heer bij me staan, die vroeg: „Vindt u ze mooi?“ Op mijn bevestigend antwoord kreeg ik te horen: „Het volgend jaar in Leeuwarden hoop ik met 90 punten uit de bus te komen,“ en hij beloofde, dat ik dan van hem zou mogen kopen.

Hij kwam een pöösje later eens bij me kijken en adviseerde me om het toch met dat miezertje, maar dan in de warmte, eens te proberen. Die pootjes waren goed zwart en de pigmentstreepjes erg fijntjes. Ik zocht er van het andere kweekstel een groene man bij, die volgens mijn handboek dubbel-passe-partout moest zijn, een broer dus van die mooie zilverbruine zussen.

En ja, het ging. Er kwamen meerdere aardige groene vogels uit de achtereenvolgende nesten; één zelfs met een voor mijn gevoel af-





Goud-groentje

wijkende kleur. Ze was meteen erg groen en had erg licht pigment, terwijl de uiterste veren van de beide vleugels lichtgrijs waren. Op de tentoonstelling in Leeuwarden trof ik m'n adviseur van het vorig jaar weer. Hij had de wedstrijd met zichzelf gewonnen. Op één van z'n koolen prijkte een kaartje met: Kampioen 90p + ere. Met spanning zag ik onze eigen clubtentoonstelling tegemoet, nadat ik in Leeuwarden gezegd had: „Ik geloof, dat ik geen vogels van u nodig heb.” Je moet maar durven! Want na vier jaren voel ik me nog steeds een „groentje”. Het is gelukkig goed uitgekapt. De mooiste (lijkend op die uit het augustusnummer 1970) haalde 89 punten. De andere 87 punten en die vreemde vogel bleek, zoals ik al gedacht had na al m'n tentoonstellingbezoeken, een goudgroene pastel te zijn met van de keurmeester als opmerking: „grijsvleugeltype”. Het is een pop en ze kreeg 88 punten. Daar zitten volgens het vriendelijke, uitgebreide telefonische advies, dat onze bondsadviseur-voor-kleurkanaries me gaf, wel nieuwe mogelijkheden in. Wat ik met dit uitgebreide betoog over een kweek met één bepaald kleurslag wil vertellen?

Wel, dat je lid moet zijn van een afdeling van onze bond; dat je ons blad goed moet lezen, want je kunt er veel uit opsteken.

Verder, dat je tentoonstellingen moet bezoeken en moet proberen uitgebreide contacten te krijgen. Zonder goede boeken gaat het niet zo gemakkelijk. Maak gebruik van de service, die je gratis van de bondsadviseurs kunt krijgen. Schrijf ze gerust een brief. Je krijgt een uitgebreid schrijven terug en bel je op naar 010-156355, dan word je, voor zover het kanaries betreft, enthousiast te woord gestaan. En dan: laat je door tegenslagen niet op de kop zitten, maar begin steeds weer opnieuw. Denk vooral niet, dat je er alles van weet. Hoe langer je bezig bent, hoe meer je beseft, dat je misschien wel altijd een „groentje” zult blijven. Er is in onze sport nog zo ontzaglijk veel te beleven en als je meent iets bereikt te hebben, kom je tot de ontdekking, dat je pas bent aangekomen bij de start van een volgende ontwikkeling.

En dan eindig ik met een lans te breken voor het goud-groentje. Ze zijn moeilijk goed te kweken, maar ze zijn zo mooi!

En voor wie van de grote verrassing houdt, moet het eens met een groene passe-partout-man proberen. Ze worden tegenwoordig nog dubbeler dan dubbel gekweekt. En wat je dan kunt zien geboren worden aan kleurvariëteiten, daar sta je gewoon van te kijken.

Show-vogels moet je dan niet meteen verwachten, maar boeiend is deze manier van kweken in hoge mate.

Anne Tseards



Zilverbruin

Ussel

De



door A. B. J. Braam

## DE STANDAARD GRASPARKIET

Alvorens men tot de aankoop overgaat van bovengenoemde grasparkieten, met de bedoeling tentoonstellingkweker te worden, moet men zich eerst goed overwegen, op welke kleurvariëteit men zich wil specialiseren.

Het is fout, om verschillende types en/of kleuren die niet bij elkaar passen aan te kopen, daar dit meestal op teleurstellingen uitloopt. Een bont allegaartje is nu eenmaal niet het doel van een ernstige TT-kweker.

Dit sluit echter niet uit, dat men meerdere types en/of kleuren zal moeten aanhouden om één kleurvariëteit met het gewenste type, zoals men zich dat voorstelt, wil creëren of perfektioneren.

Het is daarom dat wij op verzoek van de redactie, onze artikelen wijzigen.

Voor hen die verder willen gaan met de vererving, en de nomenclatuur, raden wij het boek aan van onze bekende vederstructuuronderzoeker en keurmeester de heer Beckman, dat voor iedere TT-kweker mijns inziens onmisbaar is.

Alvorens wij u trachten te helpen (waarvan vele raadgevingen uit praktische ervaring) met het verbeteren van uw lievelingskleur, en de fysieke (lichamelijke) vormen zullen wij eerst de standardeisen beschrijven van de variëteit die behandeld wordt.

Formaat: Dit mag niet te klein, doch ook niet te groot zijn, de ideale grootte is 22 cm, deze grootte moet aangepast zijn aan de lichamelijke vormen.



Type: Van achterhoofd tot puntje staart een rechte lijn zonder bulten of indeukingen; breed van schouders en zo rond en vol mogelijk van borst; buik en onderbuik zo strak mogelijk, zonder uitzakkingen; korte brede nek; de vleugels moeten strak langs het lichaam gedragen worden, niet te lang, of te kort zijn, doch zo dat de uiteinden bij elkaar komen op de bovenstuit van de staart; gekruiste vleugels wijst op een te smalle schouderpartij. De staart moet volledig zijn met twee lange staartpennen, deze mogen niet alhangen, doch in één lijn met de rug fier gedragen worden. Een drulpstaart wijst op een zwakke onderstuit; de poten behoren recht en stevig gespierd te zijn, een goede vogel zit dan ook vrij van stok. Een op de TT liggende vogel is absoluut fout, dit wijst ons op een niet goed uitgebalanceerd lichaam of de vogel voelt zich niet happy en hoort niet op de TT te staan. Een goede showvogel heeft steeds een fiere houding. De kop: deze moet breed, hoog en goed gewelfd zijn, moet van alle kanten bezien mooi rond zijn. Het oog moet niet te dicht bij het voorhoofd geplaatst zijn, maar zoveel mogelijk naar het midden van de kop. Ogen die te kort bij het voorhoofd liggen wijzen op een geknepen kop. Achter het oog ligt een diepe oogstreep. Vogels die dit missen hebben ook geen goede kopwielving, de snavel moet goed ingeplant en vooral niet te groot zijn, in geen geval mag deze vooruit steken, doch gericht zijn naar de borst, het puntje van de



snavel moet als het ware schuil gaan in de voorborst van de vogel. De houding van een goede showvogel is meer verticaal, dan horizontaal. Vanzelfsprekend dient een showvogel in goede conditie te zijn, alvorens men ermee naar de TT gaat.

**Lichtgroen:** Lichaamskleur o.a. borst, rug, flanken, buik, stuit en lendenstreek zo diep en warm mogelijk helder grasgroen, van een egale gelijkheid, masker egaal goudgeel, wangvlek violet, en aan beide zijden van de keel, drie ronde zwarte scherp omliggende keelstippen, waarvan er een gedeeltelijk schuil gaat onder de violette wangvlek. Tekening op achterhoofd, nek, wangen en vleugels diep zwart met scherpe omlijning op een heldere gele ondergrond. Lange staartveren blauwzwart, een niet heldere gele ondergrond wijst weleens op splitvogels.

Lichtgroene vogels die te licht van kleur zijn, kan men het beste koppelen aan blauwe liefst met een donkerfaktor. De nakomelingen

hiervan zullen allen groen, split blauw zijn, met en zonder donkerfaktor, dus lichtgroen en donkergroen. Deze donkergroenen zijn bijzonder geschikt om de kleur van te lichte lichtgroene op te halen, zodat de nakomelingen van donkergroen split blauw x lichtgroen beduidend beter zullen worden van kleur als de gebruikte lichtgroene ouders. Men moet echter **geen** donkergroene of kobaltblauwe vogels nemen die een gewolkte borstkleur bezitten. Goed opletten, want deze slechte eigenschap is alleen door selectie eruit te kweken. De jonge vogels die split zijn voor blauw uit genoemde koppeling, zijn zodra zij het nest verlaten, reeds te kennen aan hun iets donkerder stuit. Deze zullen op latere leeftijd een diepe warme lichtgroene kleur verkrijgen, zodat men enkele jaren geen blauw behoeft in te kruisen. Zo ziet u dat voor groenkwekers de blauwe kleur erbij gehouden dient te worden, wil men niet in kleur achteruitgaan.

Ussel



**LORETO VIT ENCIA**

**Samengestelde vitaminen voor papegaaien en grote parkieten**

Verwijdert de tekortkoming aan vitaminen bij de vogels die erdoor besmet zijn.

Bevordert de groei der veren en pluimen en verlevendigt het gèvederte.

Verkrijgbaar bij U leverancier  
Een ENCIA produkt  
UDINE (Italië)

De



## GROENSNAVELTOEKANS

Reeds lange tijd had ik het plan om eens een artikel te schrijven over groensnaveltoekans, enerzijds omdat ik deze vogels lange tijd in een van mijn volières heb gehad, anderzijds omdat enige jaren geleden in Vogelpark Walsrode een paartje groensnaveltoekans — na een aantal mislukkingen — met succes een viertal jongen grootbracht. Hiermede werd het bewijs geleverd dat het heus wel mogelijk is om deze vogels tot broeden te krijgen, zij het dat men wel geduld moet hebben en dat men moet bedenken dat een eerste broedpoging nog niet direct tot goede resultaten zal leiden, zoals verderop zal blijken uit de ervaringen in Walsrode.

Tijdens een bezoek aan Vogelpark Walsrode lukte het om een serie goede kleurenfoto's van de jonge toekans in handen te krijgen en dat was een aansporing om dan toch maar eens het een en ander over deze vogels op papier te zetten, waarbij ik uiteraard dankbaar gebruik maak van de gegevens die mij in Walsrode over het broedverloop werden verstrekt.

De Groensnaveltoekan is een van de meest ingevoerde toekansoorten en is vrij regelmatig bij de importeurs te koop. Het is een bijzonder kleurrijke vogel, zoals de kleurenfoto van de 3 volwassen toekans ook duidelijk aantoont.

Daar de meeste toekans die hier worden geïmporteerd door de vangers of inwoners van Zuid-Amerika jong uit het nest worden gehaald en met de hand grootgebracht, zijn ze meestal zeer tam. Ze zijn erg aanhankelijk en als ik de volière binnenging kwamen ze direct aangevlogen, waarbij ze vaak zeer speels waren.

Ze zijn vrij goed bestand tegen koude en mijn ervaringen zijn wat dat betreft gelijk aan die in Walsrode. In het nachthok had ik een elektrisch verwarmingselement aangebracht op enige afstand van de vaste slaappleats. Toen het begon te vriezen schakelde ik de verwarming in, maar daar moesten de toekans niets van hebben en ze zochten een andere slaappleats op; zodra het verwarmingselement niet meer brandde kwamen ze weer naar hun oude slaappleats.

Ook in Walsrode gingen de toekans zover mogelijk van de verwarming slapen als deze brandde.

Bij vorst hield ik de vogels ook overdag in het nachthok, maar in Walsrode konden ze dan

nog in de buitenvolière, waarvan ze graag gebruik maakten zonder dat dit nadelig voor hen was.

Als voedsel gaf ik de groensnaveltoekans een stevige brij van universeelvoer, oud brood of gekookte rijst, gekookt ei, honing en water. Hiervan maakte ik kleine balletjes. Verder kregen ze iedere dag in blokjes gesneden appel, peer en banaan, alsmede andere vruchten die te krijgen waren, zoals druiven, bessen, perziken e.d. en een paar keer per week kort gesneden vlees en fazantekorrels. In Walsrode bestaat het hoofdvoedsel uit vruchten, rijst en vlees, verder krijgen de vogels gekookte aardappelen, maïs en schapevlees. De Groensnaveltoekan is afkomstig uit Zuid-Oost-Brazilië, Paraguay en Noord-Oost-Argentinië.

Wij zullen ons in dit artikel verder bepalen tot het broedsucces in Vogelpark Walsrode.

In 1961 kocht men daar een drietal volwassen groensnaveltoekans, die werden ondergebracht in een volière van 4 m x 2 m x 2 m.

In 1965 werden de vogels strijdlustig en was het noodzakelijk 1 vogel uit te vangen. Toen deze vogel uit de volière was, begonnen de beide anderen in een hoek een gat te graven dat een doorsnee had van ongeveer 30 cm. en een diepte van  $\pm 20$  cm. Op 15 mei werd het eerste ei gelegd, dit was geheel wit, ovaal, met een lengte van 40 mm en een diameter van 28 mm. Met tussenpozen van steeds 1 dag werden 4 eieren gelegd. De zestiende dag na het leggen van het laatste ei, waren er 4 jongen in het nest, ze waren en blind en onbevederd.

Op de zevende dag werden de oudervogels onrustig en voerden niet meer. Plotseling haalden ze beide de jongen uit het nest, verscheurden ze en aten ze toen op.

Het volgend jaar werd in maart een uitgeholde boomstam op een hoogte van 1 meter in de volière geplaatst.

De boomstam was 42 cm hoog en had binnenin een diameter van 28 cm. De vogels zochten deze boomstam wel op, maar in mei werd toch weer een nest in de bodem van de volière gemaakt en hierin werden 4 eieren gelegd. Weer kwamen alle eieren uit na 16 dagen broeden, maar ondanks extra voeding van vlees werden op de elfde dag de jongen op dezelfde manier behandeld en opgegeten als de eerste keer.

In juli weer 4 eitjes, nu in de boomstam, 4





Ussel

De



# GROENSNAVELTOEKANS



5 dagen oud



12 dagen oud



27 dagen oud



34 dagen oud



41 dagen oud



Juist uitgevlogen jong



jongen en na 16 dagen gedood en opgegeten. In het voorjaar van 1967 werd gestopt met het voeren van vers vlees en in plaats hiervan werd hondevoer uit blik gegeven. Daar de vogels weer op de bodem gingen nestelen werd in de boomstam een laag van 5 cm zand aangebracht en nu werden op 27, 28 en 30 april eieren hierin gelegd. De eerste twee jongen kropen 15 mei uit het ei, de beide anderen op 16 mei. Alleen de pop voerde de jongen en ze verliet het nest alleen maar om te eten. Toen de jongen zeven dagen oud waren begon de man te helpen met het voeren. Het voedsel werd door de ouders klein gebeten, doorgeslikt en dan bij het voeren weer er uit gewerkt, waarbij de ouders hun snavel in die van de jongen steken. In die tijd werd 70% vleesvoeding en 30% vruchten verstrekt.


Op de 24e dag kwamen de veren door en gingen de ogen open. Vanaf die dag sliepen de ouders ook niet meer in de boomstam.

Opvallend was dat de rijkelijk geproduceerde uitwerpselen niet door de oudivogels verwijderd werden. Op de 44e dag waagde het eerste jong zich buiten het nest, de 45e dag volgden er twee en een dag later liet de laatste zich zien.

De ouders bleven ze voeren en zelfs toen de jongen al lang zelf aten, bedelden ze nog bij hun ouders om voedsel.

U ziet dat het wel nodig is om geduid op te brengen als men op kweekresultaten uit is en zeker niet na een eerste mislukking de moed maar opgeven.

Veelal doen de vogelliefhebbers die toekans in hun volière hebben niet veel moeite om de dieren tot broeden te krijgen, men is al tevreden met het genieten van de kleurenpracht en het leuke gedrag van de vogels. Toch is het zeker de moeite waard om wat meer aandacht en moeite hieraan te besteden en dat resultaten dan wel degelijk mogelijk zijn heeft Walsrode bewezen.





**WIJ BIEDEN U VRIJBLIJVEND AAN UIT BUITEN- EN BINNENVOLIERES:**

Napoleons	fl. 6,— p.p.	Witoorbulbuis	20,— p. st.
Zilverbekjes en loodbekjes	6,— p.p.	Zwartkop Timalies	45,— p. st.
Bandvinken	7,— p.p.	Senegalduiven	30,— p.p.
Ekstertjes	7,— p.p.	Staalvlekeduiven	30,— p.p.
Vuurvinken	9,— p.p.	Chinkwartels	12,50 p.p.
Goudmussen	8,— p.p.	Regenkwartels	20,— p.p.
Blauwfazantjes	8,50 p.p.	Rodeboskwartels	22,50 p.p.
Oranjeakjes	8,— p.p.	Calif. kuifkwartels	50,— p.p.
Goudbuikjes	10,— p.p.	Jap. kwartels	17,50 p.p.
Mozambiquesijsjes	11,— p.p.	Witte Japanse kwartels	25,— p.p.
Edelzangers	11,— p.p.	Mex nonpareils	20,— p. st.
Geelbuikastrildes	15,— p.p.	Veekleurenvinken	20,— p. st.
Geelstuitedelzangers	25,— p.p.	Blauwebisschoppen	22,50 p. st.
Dubbele mozambiquesijsjes	25,— p.p.	Mex goudvinken	17,50 p. st.
Staalvinken	8,— p.p.	Himalayaputters	30,— p. st.
Dominicaïnwidas	12,50 p.p.	Oevermynahs	17,50 p. st.
Oost Afr. blauwfazantjes	10,— p.p.	Hertenmynahs	22,50 p. st.
Bronzemannetjes	9,— p.p.	Pagodamerels	17,50 p. st.
Geelschouderwidas	20,— p. st.	Grijskopmerels	17,50 p. st.
Geelnekwidas	30,— p.p.	Francolinekwartels	22,50 p.p.
Koningswidas	30,— p.p.	Zilver Chinkwartels	25,— p.p.
Groenetijgervinken	25,— p.p.	Indigovinken	17,50 p. st.
Tijgervinken	8,— p.p.	Lazulivinken	20,— p. st.
Muskaatvinken	7,— p.p.	Regenboogvinken op kleur	17,50 p. st.
Driekleurnonnen	7,50 p.p.	Mex kernbijters	22,50 p. st.
Witkop en zwartkopnonnen	8,— p.p.	Roodkuifkardinalen	20,— p. st.
Blauwgrijzeroodstaartjes	9,— p.p.	Rodekardinalen	22,50 p. st.
St. Helenafazantjes	15,— p.p.	Groenekardinalen	35,— p. st.
Dubbele goudbuijes	14,— p.p.	Grasparakiets	8,50 p.p.
Angolablauwfazantjes	15,— p.p.	Regenboogparakiets	25,— p.p.
Roodkopamadines	22,50 p.p.	Muisparakiets	40,— p.p.
Grenadierwevers op kleur	22,50 p.p.	Agaporn personas	65,— p.p.
Zambawevers	20,— p.p.	Agaporn Fisheries	60,— p.p.
Pigmyduifjes	35,— p.p.	Agaporn Rosecollis	40,— p.p.
Roodesteenduijes	30,— p.p.	Tui parkiets	45,— p.p.
Diamantduifjes	20,— p.p.	Toviparkiets	55,— p.p.
Zilverdiamantduifjes	40,— p.p.	Roodelories	250,— p.p.
Zwartmaskerduifjes	20,— p.p.	Pruimkopparakiets	80,— p.p.
Zebra-duifjes	40,— p.p.	Roseborst baardparakiets	85,— p.p.
Geelsnavelperduifjes	40,— p.p.	Geelvoorhoofd	
Groenvleugelduiven	60,— p.p.	amazone papegaaien v.a.	150,— p. st.
Grijzezebravinken	10,— p.p.	Deensbont, Albino en lutinopark.	12,— p.p.
Wittezebravinken	12,— p.p.	Valkparakiets	35,— p.p.
Belgezebravinken	11,— p.p.	Nandayaparkiets	60,— p.p.
Maskerzebravinken	14,— p.p.	Sparlingparakiets	40,— p.p.
Zilvervleugelzebravinken	14,— p.p.	St. Thomasparakiets	60,— p.p.
Jap. meeuwtjes	9,— p.p.	Oranjevleugelparakiets	60,— p.p.
Japnachtgalen mannen	20,— p. st.	Kanarievleugelparakiets	55,— p.p.
Japnachtgalen poppen	12,50 p. st.	Geelmantellories	250,— p.p.
Zilveroornachtgalen	40,— p. st.	Forstenlories	200,— p.p.
Blauwvleugelnachtgalen	35,— p. st.	Halsbandparakiets	32,50 p.p.
Rijstvogels	10,— p.p.	Bontboortjes	55,— p.p.
Witterijstvogels	50,— p.p.	Grijzeroodstaartpapegaaien v.a.	175,— p. st.
Safravinken klein	20,— p.p.		
Safravinken groot	20,— p. st.		
Palmtangaras	40,— p. st.		
Himalayasijsjes	20,— p. st.		
Angola roodbekwevers	11,— p.p.		
Shamaliesters	65,— p. st.		
Bladvogels	50,— p. st.		
Blauwvleugelbladvogels	60,— p. st.		
Grote groenebladvogels	70,— p. st.		
Fairy bluebirds	150,— p.p.		
Chin. spotlijster	45,— p. st.		
Witkuifgaaien	45,— p. st.		
Surinaamsegiansmerels	20,— p. st.		
Lappenspreuwen zeldzaam	150,— p.p.		
Afr. glansmerels	20,— p. st.		
Purperglansmerels	25,— p. st.		
Geelkoptropalen	20,— p. st.		
Jacarinevinken	12,50 p. st.		
Kaneelpaapjes	20,— p.p.		
Witkeelpaapjes	15,— p.p.		
Indischenonpareils	20,— p.p.		
Bruinkoportelanen	7,50 p. st.		
Zwartkoportelanen	12,50 p. st.		
Kalabulbuis	17,50 p. st.		
Roodoorbulbuis	22,50 p. st.		

Conditie: niet franco, rembours. Minimum order / 20,—. Verpakking / 2,— per kistje. Levende aankomst en kwaliteit gegarandeert. Reclames binnen 2 dagen. Onze magazijnen zijn dagelijks geopend tot 5.30 uur. Zondags t/m 27 augustus tot 3.30 uur. In onderstaande plaatsen en data zijn wij met een grote collectie vogels voor verkoop, waar u dan zelf keus kunt maken en vrachtkosten bespaart.

Vianen: Hotel het Zwijnshoofd, Julianastraat 6, van 1.30 tot 3.30 uur. De data zijn 6 en 27 mei.

Wormerveer: Hotel de Jonge Prins, Marktstr. 2, van 9.00 tot 14.00 uur, 29 april en 20 mei.

Spijkenisse: Verenigingsgebouw het Contact, Vreedehofstr. 14, van 9.00 tot 12.00 uur 6 en 27 mei.

Schagen: Café de Posthoorn, Markt 20, van 9.30 tot 2.00 uur 13 mei en 3 juni.

**„WIRIKA” - Elschotseweg 15 - Schijndel (N.Br.) - Tel. 04104-2355**



**VOEDERS VOOR**

**ALLE VOGELS**



**V.V.R.  
VOGEL-  
VOEDERFABRIEK**



**RIJSWIJK-Z.H.  
KONINGINNELAAN 106  
TEL. 070-98 34 02**

**ORNIVIT**  
VOOR ZANG  
EN VEDERPRACHT



**ORNIVIT**

**W**BETWIST HET BESTE VOOR DE VOGEL!  
**U**I PROBLEMEN OPGELOST!  
**I**ET TE EVENAREN KWALITEIT!  
**E**DERE VOGEL EET HET GRAAG!  
**I**TAMINEN MINERALEN JUIST VERDEELD!  
**N** IEDERE KOOI OF VOLIERE!  
**E**VREDEN VOGELS KRIJGEN **ORNIVIT!**  
EEN **DUBRIRO** PRODUCT!  
POSTBUS 1178 ROTTERDAM



Deze combinatie van Vitamine B, mineralen en spoorelementen verbetert enorm de algemene conditie van al uw vogels. Betere broeduitkomsten, snelle en mooie bevedering, vooral na de rui. Voorkomt nervositeit, veren pikken en bloedarmoede. Bevordert de zang van alle zangvogels. Ook ideaal voor postduiven.

Verpakkingen f 1,30, f 3,10 en f 11,05 bij uw dienspecialzaak. Gratis P.Y.M.-folder: N.M.I. - afd. OV, postbus 40. Lunteren.

Ussel

De



# WAT LEZERS SCHRIJVEN

## De Roodfactor en Betacarotine

M. F. Moorees

Graag voldoe ik aan het verzoek van Dhr. Wolthof om ervaringen met het gebruik van Betacarotine mede te delen; een ieder kan daaruit zijn eigen conclusies trekken. Ik gebruik nu drie jaar Betacarotine en ben tot de slotsom gekomen dat Betacarotine het enige EERLIJKE roodstimulerende middel is dat door roodkwekers gebruikt kan, mag en moet worden. De voordelen van het gebruik van Betacarotine zijn in het Juninummer van Onze Vogels reeds uitvoerig toegelicht door Mevr. de Heer. Mijn eigen conclusie behoeft wel uitleg want velen zullen deze conclusie wenkbrauwenfronsend kras, zo niet erger, betitelen. Mijn eerste kweekresultaten met gebruikmaking van Betacarotine waren ronduit verbijsterend. De positieve kant van die verbijstering was minder groot dan de negatieve. Bij gebruik van canthaxanthine, hetgeen ik voorheen gebruikte, verkrijgt elke roodkweker kanaries van goed oranjerood voorzien, maar dan ook allemaal. Mijn verbijstering lag in het feit dat dit bij het gebruik van Betacarotine geenszins het geval was. Na de jeugdruil moest ik constateren dat mijn vogels in kleurvariatie uiteenliepen van oranjegeel tot diep oranjerood. De goede waren mooi helder oranjerood, dus niet met b.v. violetachtige bijkleur. Gelukkig waren dit er nog heel wat. Maar wat te doen met die andere slechte oranjerode, niet geschikt voor de TT en minder aantrekkelijk voor de verkoop? Er bleven twee mogelijkheden, het Betacarotine overboord gooien en teruggrijpen op een canthaxanthineproduct of gaan selecteren en met de goede oranjeroodfactorigen doorgaan. In het artikel van Mevr. de Heer lezen we dat bij gebruik van Betacarotine ALLEEN de vogels welke een goede roodfactor bezitten goed oranjerood zullen WORDEN. Deze eigenschap heeft mij doen besluiten door te gaan en te selecteren. Door te gaan met de vogels welke een goede oranjerode kleur lieten zien; deze moesten dan in het bezit zijn van een goede roodfactor. Deze selectie is niet toe te passen na het gebruik van canthaxanthine, we kunnen ze immers allemaal rood maken, zelfs de geelfactorigen. Het lijkt me toch wel heel prettig als we weer eens precies weten wat we op stok hebben zitten. Er is zoveel gepraat en geschreven door voor- en tegen-



Oranje Rood Brons

standers over het verven van binnen uit, het motief van de tegenstanders was steeds „Ze maken rood wat ze willen“. Dat motief gaat NIET op bij het gebruik van Betacarotine, we kunnen weer eerlijk zijn tegenover onszelf en onze liefhebberij! Een ieder kan voor zich uitmaken welk stimulerend middel (er zijn er nogal wat) hij wenst te gebruiken, maar ik hoop dat bovenstaande argumenten veel liefhebbers er toe doet besluiten over te gaan op het gebruik van Betacarotine. De vragen door Dhr. Wolthof gesteld wij ik, met de ervaring door mij opgedaan bij het gebruik van Betacarotine, beantwoorden.

1. De TT resultaten van mijn met Betacarotine opgevoerde vogels waren prima, mijn roodfactorige hebben meermalen 89 en 90 pnt. behaald.
2. U kunt zonder bezwaar ALLE geelfactorig<sup>e</sup> vogels laten eten of drinken van Betacarot<sup>i</sup>n. Wanneer echter Uw geelfactorige niet v<sup>o</sup>komen vrij zijn van de roodfactor vallen ze het gebruik van Betacarotine onmiddellijk door de mand. Dit is als een pluspunt aan te



merken omdat het de gelegenheid biedt de vogels met deze fout behept uit te selecteren. Bij deze vogels is de door U in vraag 7 bedoelde koppeling rG aan de orde. De eventuele oranje aanslag van dominantwitten en zilvertinten wordt door het verstrekken van Beta-carotine natuurlijk wel storend oranje-rood! In het algemeen moet mijns inziens geen kleurstimulans verstrekt worden aan vogels welke dat niet nodig hebben, dit is geldverspilling.

3. 4. Doe na opening van het blikje de inhoud over in een ander, GOED SLUITEND, blikje of potje en bewaar dit in de koelkast. U kunt het dan minstens een jaar(!) goed houden.

5. U heeft gelijk.

6. Er bestaat geen enkele kleurstimulans welke een recessief witte kan doen kleuren! De aanwezigheid van cb op beide chromosomen belet dit volkomen en er valt dus niets te stimuleren.

## WAT LEZERS SCHRIJVEN

### BETACAROTINE

Naar aanleiding van de reactie van de Heer W. Wolthof op mijn artikel in Onze Vogels over „Wat lezers schrijven” (Beta-Carotine), ben ik van mening dat mijn artikel over het opvoeren van oranje-rode kanaries niet helemaal is begrepen.

Ook ben ik er mij van bewust, dat mijn artikel nog niet volledig is.

Over het opvoeren van oranje-rode kanaries zou wel een compleet „Onze Vogels” mee gevuld kunnen worden. Wel ben ik er van overtuigd, dat in de toekomst nog veel over deze materie gesproken en geschreven zal worden.

Wat mijn t.t. resultaten zijn met vogels, die met Beta-Carotine zijn opgevoerd, doet volgens mij niet ter zake.

Wat ik wel belangrijk vind is, dat ik nimmer de opmerking op het keurbriefje ben tegengekomen: te onregelmatig doorgekleurd.

Dat men met een blikje van 100 gram, 100 liter water kan kleuren is juist. Een opvoerproces duurt ook  $\pm$  100 dagen. Of men het ook opgebruikt is afhankelijk van het aantal vogels, dat men kweekt.

De houdbaarheid en oplosbaarheid van Beta-Carotine is het zelfde als dat van enig ander opvoermiddel. Het verschil zit meer in de uitwerking daarvan. Beta-Carotine is een natuurproduct en zal ook geen schade aan de vogels toebrengen door overdosering.

Dat een recessief witte niet o.rood wordt door een opvoermiddel is juist, want de recessief witfactor, indien dubbel aanwezig, belet volledig de carotinoïde-vorming.

De formule rG ben ik in het boek van de Heer Veerkamp nergens tegengekomen, maar dat zal dan wel aan mij liggen. Als bij het ingezonden stuk wordt bedoeld r+G en dat deze factoren nog steeds gekoppeld liggen, dan is dit juist. Alleen de r+G is een oranje vogel en deze blijft door het toedienen van Beta-Carotine oranje en dat dit geen t.t.vogels zijn, is algemeen bekend.

Hierbij zou ik er nog op willen wijzen, dat het nimmer mijn bedoeling is geweest iemand een produkt aan te bevelen, en het andere te negeren, voordat ik het zelf uitgeprobeerd heb.

Wel is het mijn bedoeling naast de reeds bestaande produkten de kwekers(sters) op een ander goedkoop middel attent te maken, dat m.i. alleen maar een verrijking van het reeds bestaande assortiment kan beogen.

Ik hoop verder, dat de Heer Wolthof veel reacties zal mogen ontvangen, zodat men gezamenlijk tot een konklusie zal kunnen komen.

Ik hoop dan ook, dat ik t.z.t. het resultaat daarvan in „Onze Vogels” zal mogen lezen en wil tevens de correspondentie hieromtrent beëindigen.

Indien men nadere inlichtingen over Beta-Carotine wenst, kan men contact opnemen met de Heer Brokmeyer uit Rijswijk. Deze zal zeker met zijn zeer deskundige ervaring alle inlichtingen over Beta-Carotine geven, die men verlangt.

Mevr. O. de Heer

404



INSECTICIDE doodt insecten  
ONSCHADELJK / GIFVRIJ



Houdt u ècht van uw vogels?

# Bewijs het met Vogel Pecutrin!

Vogel Pecutrin is een hoogwaardig mengsel van alle voor uw vogels noodzakelijke mineralen, sporen-elementen en vitaminen. Het geeft aan kooi-vogels, volièrevogels en sierhoenders

een blijvende top-conditie. Vogel Pecutrin maakt van het dagelijks voer dagelijks volwaardig voer.

Daarom hebben èchte vogel-liefhebbers altijd Vogel Pecutrin in huis!



Bayer Farma N.V.,  
Postbus 80, Mijdrecht,  
tel. 02979-4151.



Bayer voor 'n stralende gezondheid van uw lievelingsdier.



## DE ZEBRA- VINK



*Is op pag. 100 abusievelijk genoemd dom, crème, doch is zwartmasker!*

We krijgen nu een zebra-vink voor ogen die ook weer volgens de advertenties in Onze Vogels regelmatig wordt aangeboden, nl. de isabel. Maak u echter nog niet te blij, de aangeboden vogels blijken in alle gevallen gewone normaal bruine te zijn, in vele gevallen zelfs bruine vogels die te licht van kleur zijn (goed voor de crémekweek), maar niet geschikt voor de T.T. en in het geheel geen isabellen. Over de isabel kunnen we kort zijn, dit is eigenlijk een crèmevogel zonder tekening. De man heeft dus dezelfde verschijningsvorm als de bruinvleugelmaan, het totaal

ontbreken van de borsttekening. De kleur van het rugdek is echter zuiver crème, dus opgebleekt bruin. Er is mij momenteel in Nederland geen enkele kweker van isabelzebravinken bekend, ook op de laatstgehouden bondsshow waren ze niet vertegenwoordigd. Wie spant zich hiervoor eens in?

De populairste vertegenwoordiger van ons zebravinkenbestand is op het ogenblik toch wel de zwartmaskerzebravink. Dit is eerlijk gezegd in zijn vorm ook een prachtverschijning. Bij het aanschaffen van maskerzebravinken moet u vooral letten op de diepte van



Wit

Issele

De



de tekening. Borsttekening zo donker mogelijk, de specifieke dwarstreepjes hierboven ontbreken echter. Ook oogstreep en staarttekening zo donker mogelijk en niet te vergeten de wangvlek, die bij sommige maskers haast niet meer waar te nemen is, maar toch duidelijk zichtbaar en zo diep mogelijk gekleurd moet zijn. Het rugdek is bij de ideale vogel van een zachte pasteltint, de z.g. „roomkleur“, dit is een heel zacht crèmeachtig waas. Bij de aankoop van een masker is het in het geheel niet erg dat deze roomkleur eigenlijk iets te donker is, bij een gerichte doorkweek is dit vrij gemakkelijk te miniseren. Beter dus met een te donkere vogel beginnen dan met een te lichte, daar een wit rugdek positief fout is. Opvallend is dat al naar gelang de erfelijke aanleg die het jong heeft meegekregen, men in een en hetzelfde nest opvallende verschillen bij de jongen ziet als lichte en donkere snavels en rode en donkere oogkleur. Verschillende zwartmaskerpoppen zijn iets grijs op de kop. Op de tentoonstelling zal dit worden bestraft. Als kweekvogel daarentegen kunnen ze zeer waardevol zijn. De zwartmaskermannen worden weer in schaal 1 gekeurd daar ze (op de zebratekening na) de volle en diepe tekening laten zien.

Over de witmutatie kunnen we weer vrij kort zijn. Het spreekt voor zich dat de vogel zuiver wit moet zijn, dus vrij van vreemde smetten (aanslag). Grootste fouten zijn een minder goed postuur, aanslag op de rug en een te dunne bevedering vooral aan de oorstreek. Als u witte vogels in wilt sturen naar de T.T. zult u moeten zorgen voor vrij vroege jongen, daar slechts de volwassen vogels een goed bevederde oorstreek bezitten. De witte en bonte vogels worden in schaal 3 gekeurd waar in het geheel geen punten voor tekening wordt gegeven maar de nadruk op de kleur wordt gelegd. Bij de witte vogels worden ook de poppen in dezelfde keurschaal gekeurd, wat uiteraard voor zich spreekt, daar enkel het kleine verschil in snavelkleur het verschil der seksen weergeeft. U moet bij het insturen van deze lichtgekleurde vogels naar de T.T. er wel om denken dat het verenkleeft soms vuil is. U zult de vogels dan moeten wassen. Een m.i. nog betere methode dan wassen is om de vogels steeds de beschikking te geven over schoon badwater en ze tijdens het opkooien (minimaal 3 weken en er tevens mee bezig zijn) te besproeien met b.v. een bloemenspuit. Als u dit dagelijks enkele ogenblikken doet zal de vogel na het natspuiten zichzelf gaan wassen. Dit natmaken moet natuurlijk niet 's avonds gebeuren vlak voordat de vogels zullen gaan slapen.

## “VERAKA”

Specialiteit in tentoonstellingskooien voor pelsdieren, pluimvee en vogels - Voorfronten in alle maten - Tevens opvouwbaar kooien voor honden, katten, duiven, papegaaien etc. Bondskooien - Hooiruiven - Voerbakjes - Alles gepuntlast 100% service

## “VERAKA”

Markstraat 17, Telefoon 01693 - 448  
Terheyden N.Br.

## BEA CORI



bij aandoeningen van neus- en keelslijmvliezen, bloedarmoede, longontsteking en slechte toestand door oververmoeidheid en infectieziekten.

**beaphar**  
RAALTE HOLLAND



VOGELLIEFHEBBERS, wij kunnen u nu of later weer aanbieden: Nectarvogels, Touraco's, Bladvogels, Oranje Troupialen, Toucans, Kardinalen, Gaaien, Tangara's, Roodborst Troupialen, Dwergruifjes, Papegaaien, Beo's, Loeries, Rallen, Kwartels, Brillevogels, Bulbuls Rode Rotshanen, Parkieten Vliegevangers, Lijstersoorten, Fairy-Bulbuls, Rode Rotshanen, Parkieten, Kroonvinken, Agaporniden, Wida's, Saffraanvinken, Wevers, vele soorten kleine exoten uit Afrika, India, Zuid-Amerika, enz. Ook Terrarium-dieren, o.a. Siangen, Hagedissen, Kikkers, Schildpadden, enz. Kleine Zoogdieren o.a. Dwergopossums, Eekhoorns, Aapjes, Muizen, Marmotjes, Hamsters enz.

Elke week nieuwe import uit alle Werelddelen Komt u eens kijken, bij ons slaagt u zeker! Wij verzenden door het gehele land. U weet het al jaren, voor iets moois en apart, naar:

**AVIMEX - Import-Export - Amersfoort**  
Soesterweg 201 - Telef. 03490-31217

Geopend elke dag van 10-6 uur. 's Zondags gesloten en 's woensdags na 13 uur gesloten.



# Cédé eivoer

voor parkieten, kanaries, exoten, wildzang ...



samengesteld op wetenschappelijke basis  
export over de gehele wereld

# Cédé vogelvoerders

Tilburg · Langestraat 104 · Tel: 04250-23156



## GEZA SEPT

Voorkomt en geneest virusziekten en infecties. Een goedkoop en afdoend middel dat eenvoudig toegepast kan worden: enige druppels aan het drinkwater toevoegen is voldoende.

Populierstraat 121-123  
Tel. 070-323930; Den Haag

**W. RUPPE  
VAN DER VOORT**




**NIEUW!**

## PARADISO - KOMECO ZELFBOUW VOLIERES

Geheel metalen zelfbouw kamervolières van genormaliseerde elementen. Steeds uit te breiden en onder te verdelen. Twee standaard-uitvoeringen met on-eindig veel combinatiemogelijkheden. Het past altijd! Gegarandeerd!

**PARADISO-KOMECO VOLIERE** geen kool, maar een echte vogelwoning!



Roestvrij, morsvrij, en hygiënisch. Waterdichte schuiflade. Gemakkelijk toegankelijk, veilig af te sluiten. Geen zichtbelemmering!

Montage? Het werk van een ogenblik. Geen gereedschappen nodig!

Stuur de BON of schrijf een briefkaart aan:

Metaalwarenfabriek Hulskamp n.v.

**KOMECO-DIVISION**

POSTBUS 52 14 ALKMAAR



**BON** Zend mij Uw rijk geïllustreerde prospectus met technische beschrijving en prijslijst van de PARADISO-KOMECO ZELFBOUW VOLIERES

Naam: .....

Adres: .....

Plaats: .....

Ussel

De



Welke van deze twee zangkanaries is de mooiste? Ik zou het niet weten. Persoonlijk vind ik de Waterslager de mooiste, ik vind de zang wat vrolijker dan die van de Harzer. Maar de Harzer met zijn zachte melodieuze zang, kan ik ook erg waarderen. De Harzer is in zijn lied vaak beschaafder, dan menige Waterslager, welke laatst genoemde soms veel te hard is in zijn lied, vooral als men een aantal in een zangkast in de huiskamer heeft zitten. Zie zo, dat was mijn inleiding.

Waar het mij in dit stukje om gaat is, dat we veel te weinig keurmeesters voor beide zangrichtingen hebben. Door overlijden en ouderdom zijn ons de laatste twee jaar 3 keurmeesters ontvallen. De heren Matser en Van Geel door overlijden — wij gedenken ze met weemoed; we hadden ze nog graag jaren in ons midden gehad — en de heer Van Woezik, die om gezondheidsredenen meende te moeten ophouden. Hij is ± 75 jaar en heeft zijn rust zeker verdiend. Hij heeft de sport meer dan 40 jaar gediend, en zijn ere-lidmaatschap van onze Bond ook

meester zouden kunnen volstaan, hoewel dit niet de ideale oplossing is. Streven van ons bondsbestuur is, voor elke tak van de sport één keurmeester. Nu hebben we de situatie, dat er veel verenigingen zijn, waarvan een der beide zangrichtingen er maar één, twee of drie kwekers zijn, en dus per wedstrijd maar weinig vogels inzenden, hetzij Harzers of Waterslagers. Het verdient dan aanbeveling vanwege de hoge keurlonen en reiskosten, deze door één keurmeester te laten keuren. In het verleden hadden we dan ook meerdere keurmeesters met dubbele bevoegdheid, nu hebben we er nog maar één. Ik zou dringend in overweging willen geven, er zijn zoveel prominente kwekers in ons land, denk er eens ernstig over na en mocht u in de gelegenheid zijn, om deze studie ter hand te nemen, doe het dan terwille van u zelf en voor de sport. Terwille van u zelf omdat u veel meer beleeft van uw liefhebberij (want dat is het toch) als u keurmeester bent. U kunt uw eigen vogels veel beter beoordelen, als u een cursus gevolgd hebt, u kunt door

## WIE KOMT ONZE GELEDEREN VERSTERKEN HARZER OF WATERSLAGER

H. Wieringa

dubbel en dwars verdiend. Gelukkig kunnen we van zijn grote kunde nog gebruik maken, zij het dan niet meer in het keuren van zangkanaries.

Zoals ik al opmerkte, hebben we veel te weinig zangkeurmeesters. Wel geteld negen voor de Harzers en negen voor de Waterslagers. Waarvan dan een onze keurmeesters (zij is een dame) dan de bevoegdheid heeft om beide zangrichtingen te mogen keuren. Nu kan ik me slecht voorstellen, dat er niet veel meer keurmeesters in ons land te vinden zouden zijn. Eigenlijk ben ik van mening, dat we met een spoedcursus, zoals in het verleden meer gebeurd is, er in één à twee jaar minstens het driedubbele zouden kunnen hebben. Als ik eerlijk ben hebben we dit aantal nu niet direct nodig, maar een flinke aanvulling van beide zangrichtingen, is dringend gewenst. Één der oplossingen zou o.a. kunnen zijn, dat er van onze keurmeesters, die we nu hebben, lieden gevonden worden die beide zangrichtingen kunnen keuren, zodat b.v. verenigingen waar beide zangrichtingen vertegenwoordigd zijn, deze met één keur-

causerie etc. meer en beter propaganda voeren voor onze mooie zangkanaries, en als u eens pech op de wedstrijden heeft, ook beter begrip opbrengen, waarom uw vogels niet of slecht gezongen hebben. Een lid van onze vereniging die keurmeester wilde worden, heb ik ongeveer 7 à 8 maanden les gegeven, maar door huiselijke omstandigheden moest hij opgeven. Dit vond ik een verlies, want hij was het beslist geworden. Iedereen met een normale schoolopleiding, een beetje muzikaal gehoor en gevoel, kan met goede wil en ambitie een goede zangkanarie-keurmeester worden. Elke keurmeester is bereid u daarbij zonder kosten te helpen en les te geven.

Bij ons huidige korps zijn er al meerdere leden, die over enige jaren noodgedwongen, door ouderdom, hun ambt neer moeten leggen. Aan de jongere generatie de plicht het vaandel over te nemen en te zorgen dat er voldoende keurmeesters zijn. De liefhebberij is het ten volle waard, het is aan u of er in de toekomst nog voldoende vakbekwame keurmeesters zijn.



# ALLESTERIN

## De conditiestimulans voor uw kostbare vogels!

Het kleurige korreltje in het WITTE MOLEN zaadmengsel zit er niet voor niets in. De — GELE — korrel in het kanariezaad, de — GROENE — voor de parkieten en de — ROSE — korrels in het tropisch zaad, bevatten onontbeerlijke stoffen om een — TOP-CONDITIE — te bereiken.

De Allesterinkorrel bevat niet alleen vitamine A-D<sub>3</sub>, vitamine E-K<sub>3</sub> tevens nicotinezuur, panthotheenzuur, cholinechloride, vitamine B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub>-B<sub>6</sub> foliumzuur.

Eveneens zijn calcium, fosfor, natriumchloride, magnesium, mangaan, vitamine C, ijzer, zink, koper en jodium niet vergeten. Stoffen die wel in zaden voorkomen, doch door de vogels niet of moeilijk opgenomen kunnen worden zijn opgesloten in — ALLESTERIN —. Hierdoor wordt een volledig benuttingseffect van noodzakelijke levensstoffen verkregen. Per vogelsoort heeft WITTE MOLEN — Allesterin —, die de natuurlijke omstandigheden evenaart aangepast.

ALLES-ER-IN een algehele omwenteling in de voedermethode.

Een nieuw product vervaardigd in nauwe samenwerking met Philips-Duphar Nederland N.V.

Verkrijgbaar in kleinverpakking en verpakkingen van 2½ en 5 kg.



## witte molen

de wieken altijd in  
de juiste stand.

EEN ONSMAKELIJK  
PRAATJE OVER EEN  
SMAKELIJK VOGELDIEET:  
DANK ZIJ

**VETTE KORREL**

GEEN PLAKKERIGE EN  
DUNNE MESTHEER.

PRIJS PER KG F. **1,80**

\* UW WINKELIER  
HEEFT HET.



EEN KUUR MET

## Gecolina-K3



HET SUKSES VOOR 1972

Gezonde ouden — Gezonde jongen

GECOLINA-K3 ter bestrijding van darmstoornissen, coccidiose enz. (mager worden, dunne afgang, lusteloosheid, roodbuikigheid enz.)

Ook de sluimerende ziekten die men niet bemerkt, maar waardoor uw vogels niet in konditie komen, worden door een GECOLINA-K3-kuur bestreden. Gratis folder!

GECO-Labor, Venlo: Fabr. van **Vinka**



Bird specialist

Vrijblijvend kunnen wij u aanbieden alle soorten kanaries, Australische prachtvinken, Afrikaanse vinken, Zuidamerikaanse vinken, alle soorten parkietachtigen, diverse soorten toucans, siereendjes, kwartels, flamingo's, zwanen, papegaaien, ara's, enz. enz. Steeds duizenden vogels in voorraad.

Wij vragen te koop: alle soorten sier- en watervogels.

**BLANKESTIJN'S VOGELHANDEL**

Dahliastraat 39 - Veenendaal - Telefoon 08385 - 12367



## Vogels en antiek zijn geen koopwaar



De waarde van antiek is zoveel als een gek er voor wil geven vermog dan slechts een abstracte volzin zijn, de strekking ervan is zonder meer duidelijk.

Elimineren we de component van de ouderdom, dan worden antiek en vogel als marktprodukt onderling vergelijkbaar.

In het seizoen van de tentoonstellingen, die thans weer overal in ons land worden gehouden, bereiken de vraag en het aanbod van vogels het jaarlijkse hoogtepunt. Daar geraken tal van vogelliefhebbers onder de bekoring van al het fraais, dat geëxposeerd wordt. Menig aspirant-koper wordt overmeesterd door een vaak oogverblindende begeerte.

### Prijsonbewuste kopers

Het is juist deze niets ontziende drang naar een uniek kweekprodukt, die aan de basis ligt van een onverantwoorde prijs. Daarbij komt nog dat in vele gevallen koper en verkoper zich op dit terrein volkomen prijsconbewust zijn, hetgeen een redelijke toenadering met betrekking tot de kostprijs bemoedigt. Derhalve een zaak die parallel loopt met de markt van antiek. Overigens volkomen logisch, als we bedenken dat beide produkten in de strikte zin van woord en wet geen koopwaar zijn. Dit maakt een ruime marge in de prijstolerantie mogelijk. Een landelijke of regionale prijscontrole is niet efficiënt uitvoerbaar. Zodoende kan de overeenkomst tussen vraag en aanbod evolueren naar een

onevenredig prijsniveau. Daarbij komt nog het frequent volkomen onbekend-zijn met de factor van het voeren van enig handelsbeleid van koper en verkoper.

### Prijsbepalende factoren

Een prijsindicatie uit de economische wetten van vraag en aanbod is op de vogelmarkt niet mogelijk. Het zullen louter alternatieve factoren zijn die in dit bestek prijsbepalend werken. Ik wil evenwel duidelijk voorop stellen, dat het hier om vogels gaat, die men regelmatig op de tentoonstellingen ziet en die we derhalve, uitzonderingen daargelaten, niet als zeldzaam kunnen kwalificeren.

Als richtprijs wordt veelal de prijs, die in de winter voor een bepaald soort vogel betaald wordt, aangehouden. Een prijs die landelijk vrijwel op hetzelfde niveau ligt. In de regel zullen zich tot zover, wanneer tenminste de kwaliteitsfactor wordt uitgeschakeld, geen problemen voordoen. Dit zijn echter juist de fraaie kweekprodukten die op de tentoonstellingen bij tal van vogelliefhebbers als een rode lap op een stier werken. Zij worden er, op zijn zachtst uitgedrukt, door geboid en de drang naar het bezit ervan wordt vrijwel onweerstaanbaar. Nu zijn veel vogels, die een hoge waardering behaalden, niet te koop, omdat de eigenaar ze zelf wil behouden, als zijnde een onmisbare schakel in zijn stam, voor toepassing van lijnenteelt. Maar diezelfde eigenaar verklaart tegenover de potentiële verkoper nog wel het een en ander „thuis” te hebben. Voor gerenommeerde kwekers is dit een redelijk uitgangspunt; voor de mindere goden meestal altijd het einde van de transactie.

In het algemeen gelden als prijsbepalende factoren:

1. kwaliteit
  - a. concreet gebaseerd op de waardering van de keurmeester, wanneer rechtstreeks op de tentoonstelling wordt gekocht;
  - b. op basis van het vertrouwen, die de erkende kweker-verkoper regionaal of landelijk geniet, wanneer de vogel „thuis” wordt gekocht;
2. de achtergrondrichtprijs die in de regel in de handel als norm geldt;
3. de betrekkelijke zeldzaamheid van de vogelsoort;
4. de relatie tussen de vraag en het aanbod;
5. regionale fluctuaties in het prijsniveau door het ontbreken van een duidelijke, overkoepelende landelijke prijsindicator;
6. een aantal psychologische factoren, zoals de relatie tussen koper en verkoper, de vertrouwensbasis die een kweker zich in de loop van de jaren heeft weten te verwerven, enz.



### De vogelkoopman is geen lichte operette

Carl Zellers operette „De Vogelkoopman“ vermag dan uiterst veelbezongen, komisch en lichtvoetig zijn, in werkelijkheid is onze Nederlandse vogelhandelaar een sterk bekritiseerde figuur, die in de regel het misnoegen van de teleurgestelde koper moet incasseren. Weliswaar soms terecht, echter vaak ook ten onrechte.

Alvorens tot het kopen van vogels over te gaan, moet de potentiële koper zich van een aantal zaken terdege bewust zijn:

1. Een landelijke richtprijs voor een bepaalde vogelsoort, temeer als er een kwaliteitsels in het geding is, is te enen male niet duidelijk aanwezig;
2. De begeerte naar vogels met fraaie uiterlijke eigenschappen overheerst in de regel. De latente of verborgen eigenschappen, die voor de vererving van minstens even grote waarde zijn, blijven buiten beschouwing;
3. Teneinde deze factoren te kunnen beoordelen zal hij zelf deskundig moeten zijn of zal hij een deskundige kweker in de arm moeten nemen;
4. Het bereiken van de top in één of in slechts enkele jaren, is zelfs met het aanschaffen van topvogels, niet haalbaar;
5. Een gretig koper, dat wil zeggen een koper die bereid is „flink wat“ te betalen, behoeft nog geen gedegen vogelliefhebber te zijn;
6. Een kweker zal de beste vogels in de regel zelf voor zijn lijnenteelt behouden. Slechts zijn tweede-keus-vogels komen derhalve voor verkoop in aanmerking;
7. De kwestie van het vertrouwen is ter vrije interpretatie, maar speelt niettemin een belangrijke rol; en
8. Tenslotte, als last but not least, de geluksfactor: Van een matige of slechte vogel kun je geen goede nateelt verwachten; hetgeen niet automatisch inhoudt, dat een goede vogel altijd een goed kweekprodukt vererft. Daarvoor hebben wij allen, naast een ruime kennis en ervaring, bovendien nog dat „greintje“ geluk nodig.

Het transactiebeleid van degenen, die straks vogels gaan kopen, moet gebaseerd zijn op een optimaal prijsbewust zijn. Teleurstellingen, voortvloeiend uit abnormaal hoge uitgaven voor het kopen van vogels kunnen dan drastisch worden beperkt. Zolang er echter nog een zeker automatisme van de prijzentractie, die min of meer regionaal gebonden is, blijft bestaan, blijven we terugvallen op het in de aanhef gestelde en moeten we vogels en antiek als marktprodukt onvoorwaardelijk onder één noemer blijven brengen.

F. A. J. Minnebo



# 404

Een volkomen veilig en giftvrij insecticide.

Doodt feilloos alle insecten in huizen, hokken, kooien, manden etc.

**W. RUPPE  
VAN DER VOORT**



### KLEINE ADVERTENTIES

Uw adres voor: Div. Motor-Vlakbroedmachines, Onderdelen en Elstein donker-stralers, van 60 tot 250 Watt. Een nieuw model Vlakbroedmachine: 1972, autom. modernst-economis 70 eier. broedklaar met garantie geleverd. Maar voor f 105,— incl. B.T.W. Folders met afbeeldingen en prijzen gratis.

A. M. KOKKE

Bredeweg 30 — Groesbeek — Telefoon 08891 - 1632

### AUSTRALISCHE PARKIETEN

Verzorging en kweek in Europa. Dr. H. D. Groen. Tweede, herziene en vergrote uitgave. Privé editie. Niet in de boekhandel. Verzending geschiedt franco na overmaking van f 31,50 per postwissel of giro aan: Dr. H. D. Groen, Ubbo Emmiusingel 52, Groningen, Giro 833045.

**RATTEN- OF KATTENPLAAG?** Onze doorloopvangkool vangt ze feilloos, f 35,—, 3 stuks franco. **RATTEN-KLEMMEN** 5 stuks f 45,— franco. Bel direct!

### DIVOZA vangkooien- en nettenfabriek.

Bosweg 18-19 - Leek (Gr.) - Telefoon 05945 - 21 45. Voor alles wat vangt.

### VOGELVRIENDEN, OPGELET!

Wij bieden u regelmatig te koop aan honderden vogels, zowel tropische als Austr. parkieten, kwartels, papegaaien, enz. Te koop gevraagd: alle vogelsoorten. Komt u vrijblijvend eens kijken! Maar de in- en verkoop alleen na telef. afspraak, ook op zondag.

### Vogelhandel „De Vogelenhof“

C. v. d. Fliert - Plateaanlaan 10 - Scherpenzeel (Gld.)  
Telefoon 03497-1830.

### LEES DE VOGELWERELD

Maandelijks tijdschrift van de A.O.B. (Belgische Ornithologische Vereniging). 64 bladzijden artikel en kleurplaten.

— Jaarlijks sbonnement van oktober tot september, ten bedrage van 11 gulden, te storten op girorekening 115834 van „De Vogelwereld-Braine - l'Alleud“.

— Gratis proefnummer op aanvraag aan: A.O.B. - Bureau, rue des Tisserands, 13, B-1420 Braine - l'Alleud (België).



# BOEKENNIEUWS



Als laatste aflevering van „Het Vogelparadijs in Kleuren“ verscheen **deel II** van „**Vogels van Zuid-Amerika**“. Zoals bekend is dit een uitgave van **L. S. M. te Gorsse**.

Uitgangspunt van alle delen in deze serie zijn de prachtige kleurplaten uit de wereldberoemde boeken van John Gould.

Voor dit deel heeft de samensteller, tevens auteur van de teksten bij de kleurplaten, **A. Rutgers**, een keuze gemaakt uit de „*Monograph of Trochilidae*“. Dat deze keuze niet gemakkelijk zal zijn geweest kunnen we ons voorstellen, want deze monografie bestaat uit maar liefst 5 delen met ruim 400 kleurplaten. Alleen kolibri's dus in dit deel, maar welk een verscheidenheid van vorm, bouw en kleur. Deze verscheidenheid rechtvaardigt het volkomen om aan deze dwergen onder de vogels een heel boek in deze serie te wijden. De teksten bij de kleurplaten geven weer veel informatie over iedere soort.

Bij **Uitgeverij Ploegsma** in Amsterdam verscheen „**Vogels van de week**“ door **Bert Garthoff**. Het is de bundeling van een serie uitzendingen over vogels die Garthoff in zijn bekende en populaire zondagochtendprogramma „Weer of geen weer“ voor de microfoon heeft gebracht.

Naar aanleiding van het Europese natuurbeschermingsjaar in 1970 begon hij een serie onder de titel „Vogel van de week“ en de meeste lezers zullen dit programma-onderdeel wel eens beluisterd hebben, het begon met de zang van de vogel van de week en dan begon Garthoff op de van hem bekende speelse wijze over de vogel te vertellen.

In dit boek vindt u de teksten van 52 uitzendingen, over 52 vogels derhalve.

Een heerlijk boek dat men geneigd is in één ruk uit te lezen. Wij willen nog de fraaie illustraties vermelden naar houtsneden uit een tweetal bekende oude Engelse uitgaven. De prijs van „De Vogel van de Week“ bedraagt f. 12.90.



*Advertentie*

## HOE BOVENSTAANDE BOEKEN AAN TE VRAGEN:

U zendt een brief(kaart) zonder postzegel aan **Koens algemene boekhandel**, antwoordnummer 1085, 's-Gravenhage met de tekst:

Ik verzoek vrijblijvend zichtzending van ..... (titel van het boek dat U wilt ontvangen) plus Uw naam en adres.





## NESTSTAND GEKRAAGDE ROODSTAART

In het artikeltje over de gekraagde roodstaart in het septembernummer van „Onze Vogels” schrijft de auteur, de heer J. Konings, in de voorlaatste alinea: „Wellicht hebben ook andere waarnemers hetzelfde geconstateerd hoewel ik nog geen enkele publicatie dien-aangaande ben tegengekomen en in geen enkel vogelboek wordt er gewag van gemaakt. Het is ook tegen de gevestigde regels.” Hierover wil ik graag iets zeggen.

In mijn boekje „Vogelnesten en eieren” heb ik er geen gewag van gemaakt, omdat ik persoonlijk nooit een echt grondnest hebt gevonden. Wel eens eentje, dat circa twee dm boven de grond zat, maar nooit op de grond. Maar in de literatuur wordt zulks wel degelijk vermeld en ik zal een paar citeren: „Soms vindt men het in hout- en steenhopen, op de grond onder wortels en in weggegoorpen bussen.” (Oologia Belgica door Reneé Verheyen.)

„Ook wel in of op den grond in dorre bladeren enz.” (Oologia Neerlandica door A. A. van Pelt Lechner.)

„Zowel dichtbij als ver van de grond. Ook

wel op de grond.” (De eieren en nesten van onze vogels door J. G. Th. van Nes.)

„Also on ground in banks or among bracken or other vegetation.” (Collings pocket guide to Nests and Eggs.)

„Vanaf de grond tot op circa acht meter hoogte” (Broedende vogels, hun nesten, eieren en jongen.)

„Nest sometimes actually on ground amongst roots, at foot of a stump and even in little tunnels under dead bracken” (Handbook of British Birds, Vol. II.)

„A nest on the ground is very rare but Mr. John Walpole Bond vouches for the fact from several sources.” (The Birds of the British Isles, vol. III.)

„Or occasionally on the ground under vegetation” Birds of the World, vol. VI.)

Dit lijstje is nog wel aan te vullen, maar uit deze citaten blijkt wel, dat hoewel grondnesten beslist niet alledaags zijn, ze toch wel voorkomen en wellicht vaker dan men denkt. Maar ik ben het met de heer Konings volkomen eens, dat „soms op de grond” gerust kan worden toegevoegd.



# VAN ALLES WAT

## Nogmaals wie de jeugd heeft...

Dat er meerdere jeugdleden zijn die met hun vogels op de wedstrijden behoorlijk van leer weten te trekken bewijst deze foto en de medeling van de afdeling Swalmen. Johnny Theeunissen met zijn zebra-vink en nog maar „enkele“ van zijn behaalde trofeeën.



## België

Enige tijd geleden hebben wij een schrijven gericht naar de Minister van Landbouw in België. Het leek ons een goede zaak om ook eens ONS standpunt t.a.v. van zijn beleid inzake de wildvang kenbaar te maken. Afgezien van het feit dat ook wij niet gelukkig zijn met de vogelvangst ten behoeve van de consumptie en hem dit hebben laten weten, zijn wij echter wel van mening dat een gelimiteerde vangst ten behoeve van de vogelliefhebberij verantwoord is. Voorts zijn wij er van overtuigd dat de cijfers over die vogelvangst, welke cijfers wij regelmatig middels onze persmedia kunnen vernemen, zwaar overdreven zijn. Het is een onmogelijke zaak om binnen het raam van hun mogelijkheden aan dergelijk exorbitant hoge aantallen te komen. Deze cijfers zijn gewoon onjuist en moeten er kennelijk alleen maar toe dienen een overdreven sentiment te kweken. Wij zijn echt wel een beetje jaloers op onze Belgische medestanders die beslist wel ruimere mogelijkheden hebben en meer van de wildvang kunnen genieten dan wij. Dit alles is mogelijk omdat hun ambtenarenkorps de mogelijkheden die hun Vogelwet biedt wel toepast. Het leek ons goed dit eens aan bedoelde minister mede te delen in afwijking van hetgeen vele van onze landgenoten hem hebben verteld. Maar, wat weten ONZE landgenoten van ONZE liefhebberij?

## Schedeldakbloeding

De afdeling Nuth berichtte ons dat een van hun leden nogal wat sterfte had bij zijn kanaries. Onderzoek wees uit dat deze sterfte te wijten was aan schedeldakbloedingen. De oorzaak hiervan bleek te liggen in het met een elektrische boormachine gaten boren in ijzeren palen van het broedhok. De ontstane trillingen bleken voor vele vogels te veel te zijn met het gerelateerde gevolg. Wellicht kunt u met deze mededeling uw voordeel doen.

## Over ringen gesproken...

In het maartnummer van Kanarienvriend, een uitgave van de Duitse organisatie DKB, lasen wij een officiële mededeling van de heer Hirschmann, penningmeester/ringencommissaris van die organisatie, dat door hem tijdig de ringlijsten c.q. de ringenbestelling, ter hand zijn gesteld van de leverancier de firma Hans Herr te Karlsruhe. Genoemde firma is echter met de aflevering danig in het slop geraakt. De kwekers die reeds jongen hebben liggen worden verzocht rechtstreeks met de fabrikant in contact te treden.

En bij ons..? Alle ringen die tot en met 3 november 1971 waren besteld, en dat waren er nogal wat, zijn omstreeks nieuwjaar afgeleverd. De daarna ontvangen bestellingen zijn in een vlot tempo gevolgd en op dit moment is de levertijd drie à vier weken. We kankeren wel eens, maar enfin u ziet het..

## Avimex verhuist

Onze adverteerder, AVIMEX uit Amersfoort heeft een nieuw pand betrokken. In een goed ingedeelde en benutte ruimte en met een licht modern interieur waar de vogels en andere dieren in aparte ruimten zijn ondergebracht voldoet het geheel aan de huidige eisen. Belangrijk is ook dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. Wij wensen Avimex bijzonder veel succes. U kunt de zaak vinden op het adres: Soesterweg 201. Het telefoonnummer is ongewijzigd.

Ussel

De





**Sluis**

**uit een goed nest....  
voor een goed nest!**



Met Sluis opfokvoerders kweekt u prachtvogels. Want dit voer heeft een grote verteerbaarheid, het eiwit heeft een hoge biologische waarde . . . en Sluis opfokvoerders bevatten het antibioticum OXYTETRACYCLINE. Dit beschermt uw vogels tegen dodelijke infectieziekten en bevordert de groei. Sluis opfokvoerders . . . voor een goed nest !







## WIMO-FOK TOP 55

Belangrijk is de kennis van de betrokken vogelsoort om succes te boeken. Daarnaast de huisvesting, een goede verzorging en de juiste voeding. Vooral tijdens het broedseizoen kunnen de gestelde eisen niet hoog genoeg zijn. Dit zachtvoer moet immers alle noodzakelijke stoffen bevatten die nodig zijn om een gezonde snelle opgroei te verzekeren.

Behalve dierlijke en plantaardige eiwitten, vitaminen en sporenelementen bevat WIMO-FOK TOP 55 een toevoeging van **Lysine en Methionine**. Amino's om een maximum aan opbouwstoffen van de eiwitten te verkrijgen.

**Kortom een opfokvoer hetwelk voorziet in de behoefte van groeistoffen die nodig zijn voor de opbouw van het vogellichaam.**

WIMO-FOK TOP 55 wordt in vacuümdroge toestand afgeleverd. Alvorens te gebruiken dient WIMO-FOK met ruim vocht aangemaakt te worden.

WIMO-FOK TOP 55 heeft een groot vochtabsorberend vermogen. 25 tot 30 1/2 vocht in de vorm van water, vruchtensap e.d. kan in het opfokvoer worden vermengd. Hiermee wordt bereikt dat het zachtvoer makkelijk wordt opgenomen.

Opgroeiende jongen zullen daardoor de opbouwstoffen volledig kunnen benutten.

Voor de Roodfactorige vogels is er WIMO-FOK TOP 55 ROOD met canthaxanthine.



witte molen

WIMO-FOK TOP 55 —  
dat is het helemaal!