

# Onze **Vogels**

maandblad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

nummer 11 - november 2020



■ TURQUOISINEPARKIET ■ VOER ■ GEEL

# VAN KEULEN KOOIEN

• BROEDKOOIEN • VERKOOPKOOIEN • ZIEKENKOOIEN • VOGELPOSTERS •

Van Keulen heeft een uniek kooienprogramma voor de liefhebber en de handel. Uitgebreide informatie staat in de gratis folder die u bij ons kunt aanvragen.



Ambachtsweg 20  
7442 CS Nijverdal  
Tel: 0548 - 612 452  
Fax: 0548 - 611 155

WWW.ANIMALPOSTERS.NL • E-MAIL: INFO@ANIMALPOSTERS.NL



## Dé webwinkel voor al uw vogelartikelen! Bakker kunststof kooien



- ✓ Nieuwe modellen
- ✓ Lades in kleur
- ✓ 100% kunststof
- ✓ Vluchtkooien
- ✓ Kleurecht
- ✓ LED verlichting mogelijk



GRATIS VERZENDING!  
vanaf € 75,-



Uitgebalanceerd voer maakt uw vogels actief en levenslustig, beïnvloedt de weerstand en is bepalend voor hun levensverwachting.

3828 parkiet extra voor gras- en Engelse parkieten is:

- ✓ Rijk in samenstelling
- ✓ Geschikt voor vogels die veel energie verbruiken
- ✓ Geschikt voor vogels waarmee gekweekt wordt

Zoek jouw verkooppunt via [www.garvo.nl/winkels](http://www.garvo.nl/winkels)



Probeer het nu maar!  
Het werkt echt!

## Perform

Voor een glanzend verenpak en zuivere  
luchtwegen!

Refona, de kracht van de natuur.

De Noesten 5b | 9431 TC Westerbork | Tel.: (0593) 37 00 35  
[www.refona.nl](http://www.refona.nl) | [info@refona.nl](mailto:info@refona.nl)

**NIEUW**

[www.tauros-diagnostik-shop.de](http://www.tauros-diagnostik-shop.de)





**04** Column voorzitter **05** Op bezoek bij Lex Meulenbroek **06** Wat een ellende  
**09** Trosgierst kweken **10** Spitsstaartamadine bruin en mokkabruin **13** Tips uit de  
keuken **14** Turquoise parkiet **17** Mijn tuintje **20** Column keurmeester **21** Poicephalus  
damarensis **22** In de keuken van... Bep Crouzen **26** Voer voor vogels **28** De nationale  
vogel van... Turkije **30** Een gele kleurkanarie moeilijk te kweken? **32** Het begon zo  
**33** Bondsmededelingen **33** Nestkast **34** NBvV info **35** Kalender, glosters



Foto voorpagina: man kleine cubavink, foto Henk vd. Meer

colofon



**UITGEVER**

'Onze Vogels' is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 23.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 24.000 exemplaren.

Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat voor iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging om verspreid lid worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost € 40,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).

**ABONNEMENTSPRIJZEN**

Nederland € 30,- (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd). België € 32,-, Priority-post naar alle andere landen € 94,-. Verspreid lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

**ADRES**

NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007, e-mail: info@nbv.nl, website: www.nbv.nl  
Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A)  
t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers. De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.

**REDACTIE**

**Hoofdredactie:** Henk Branje – te bereiken via E-mail: hbranje@icloud.com  
**Redactieadres:** Bondsbureau NBvV, t.a.v. redactie Onze Vogels, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom. Tel. 0164-235007 E-mail: info@nbv.nl  
Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bondsbureau.

**ZAKELIJKE ADVERTENTIES**

Tarieven en deadlines voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen via het bondsbureau te Bergen op Zoom.

**VERANTWOORDELIJKHEID**

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties.

De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

**VORMGEVING:**

Maarten Molenaar, Dock35 Marketing, Doetinchem

**DRUK:** Senefelder Misset B.V., Doetinchem

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.

**BEËINDIGING LIDMAATSCHAP:**

Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per kwartaal. Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bondsbureau.

De NBvV is internationaal aangesloten bij: COM-Mondial & Entente Europeenne d'Aviculture et de Cuniculture





## Dat krijg je ervan.....

**Henk van der Wal** mag ik zolangzamerhand toch echt wel tot een van mijn vogelvrienden rekenen. Zeer regelmatig voeren we overleg, vaak in de auto, over zaken die betrekking hebben op het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn. Daarnaast heeft Henk een schat aan bestuurlijke ervaring in de vogelwereld en een bijna encyclopedische kennis met betrekking tot de vogelsport. Een ritje naar een bijeenkomst of vergadering vliegt vaak voorbij, want Henk weet veel te vertellen en heeft als tweede hobby; het voeren van lange monologen.

Op een van onze ritten kwam het onderwerp *communiceren met vogels* aan de orde, dit naar aanleiding van ons bezoek aan de Raad van Dierenaangelegenheden, waar dit onderwerp al eerder aangesneden was. Aanvankelijk deden we daar wat lacherig over, maar het werd steeds serieuzer. Volgens Henk zou daar wel een monografie/studie aan te wijden zijn. Maar al pratend vroeg ik me af of dat wel verstandig zou zijn. We weten daar nagenoeg niks van en hoe zouden de vogelliefhebbers zoiets interpreteren en stel dat ze het communiceren zonder speciale opleiding zomaar op hun vogels gaan toepassen..... Kan zoiets ook uit de hand lopen? Komen hierbij krachten vrij die mogelijk niet te beteugelen zijn.....

Maar Henk, toch ook wel lichtelijk eigenwijs, was niet meer op andere gedachten te brengen, hier moest en zou een monografie over verschijnen en wel zo snel mogelijk.

In de column van april deed ik een oproep om ervaringen te delen met Henk. Al gauw kreeg Henk vanuit heel Nederland

enthousiaste bijdragen. Henk blij, maar bij mij bleef er toch iets van onrust knagen. Hadden we niet iets over het hoofd gezien? Wellicht kwam de hint vanuit Zeeland. De familie Bonte, die ook had gereageerd, had zelfs de moeite genomen een ethogram van hun vogels te maken. Doel van de ethologie is om de gedragingen; eten, slapen, poetsen, nestelen, voeren, paren, enz. van dieren wetenschappelijk in kaart te brengen. Danig onder de indruk van deze Zeeuwse observaties vroeg ik me af of dit onderdeel niet verder onderzocht moest worden alvorens de monografie te publiceren, maar Henk wilde dat liever in een vervolgstudie doen.

Mijn angst dat dit tot gevaarlijke communicatie experimenten zou kunnen leiden, werd helaas vorige maand door de Nederlandse media bevestigd.

### **Britse dierentuin verplaatst papegaaien die constant bezoekers afkraken** (bron: Nu.nl)

*Een dierentuin in het Britse graafschap Lincolnshire heeft vijf onlangs overgenomen papegaaien uit het zicht moeten halen, omdat de dieren meerdere bezoekers de huid vol hadden gescholden.....*

Bent u na het lezen van deze knipoog-anekdote nieuwsgierig geworden naar de monografie en wilt u hier meer over weten of misschien meewerken, stuur dan een mailtje naar [hkvdwal@planet.nl](mailto:hkvdwal@planet.nl) U doet ons, en de Universiteit van Wageningen, daar een groot plezier mee.

Klaas Snijder  
bondsvoorzitter



## Heilzame klei

In Zuid-Amerikaanse oerwouden kan men honderden papegaaiachtigen aantreffen op de oeverwanden van rivieren. Deze wanden bevatten kaoline, een stof die van nature de eigenschap heeft om bepaalde gifstoffen te kunnen binden. Gifstoffen die de papegaaiachtigen (ara, pionus, amazone etc.) opnemen bij het eten van onrijpe vruchten. Deze gifstoffen geven de vruchten in principe bescherming tegen vraat door dieren/insecten. Het is dan natuurlijk de bedoeling dat deze vreters ziek worden van de gifstoffen. Papegaaiachtigen hebben echter hun eigen natuurmedicijn gevonden in de vorm van het genoemde kleiminaeraal kaolien. Wel moeten ze tijdens hun 'kuur' goed opletten. Predatoren zoals de jaguar en de poema, die best wel een papegaaitje lusten, weten de kleiwanden immers ook te vinden.

Op bezoek bij

# Lex Meulenbroek

## Een nieuwe liefhebber maakt een flitsende start

Tekst en foto's: PIET STIGTER

**B**egin 2019 kwam hij als nieuw lid op de ledenbijeenkomst. Heel bescheiden stelde hij zich desgevraagd voor als zijnde iemand 'die kwam om van alles te leren'. Nog geen duidelijk idee over wat voor vogels hij zou gaan houden en een volière moest nog worden gebouwd. In de afgelopen periode heeft hij zich laten kennen als een prettig persoon, die bereid was van iedereen wel wat op

te steken. Regelmatig werden we op de hoogte gehouden met de vorderingen van de volièrebouw en de nieuwe aanschaf van vogels.

Toen ik onlangs bij hem kwam om een vogel te brengen was de verrassing groot!

Op weg naar de tuin stonden in een bijkamer een aantal broedkooien met verschillende vogels op het nest. Doorgelopen naar de tuin stond daar zijn volière, zo mooi en perfect afgevoerd als of hij door een meubelmaker

was gemaakt. En dat niet alleen; de bodem was, als door een tuinarchitect ontworpen, met groen, een vijver en alle verdere denkbare voorzieningen aanwezig, om het de vogels naar de zin te maken.

De keur aan vogels, waaronder diamantvinken, papegaaiamadines, bichenowastrildes, gouldamadines, binsenastrildes, spitsstaartamadines, diamantduifjes en op de grond Chinese dwergkwartels konden zich volledig uitleven.

Hij vertelde dat hij heel veel jaren geleden ook al wat vogels had gehad maar door diverse omstandigheden was hij daar niet verder mee doorgaan.

Inmiddels waren zijn dochter en kleindochter ook langsgeslagen en toen bleek dat het 'vogelvirus' ook op hen was overgeslagen en was pa/opa alweer aan het bouwen aan een vogelverblijf voor hun toekomstige vogels.

Om mijn woorden kracht bij te zetten hierbij enkele foto's.

Dank voor het inblikje in jouw leven met de vogels. Veel succes gewenst.





Bloedluis

# Wat een *Ellende!*

**Nooit eerder in mijn leven als vogelkweker (dus vrijwel mijn hele leven), beleefde ik zoveel ellende als dit jaar met de vogelkweek.** Tekst en foto's: LOU MEGENS

**R**ampspoed en verdoemenis, zo laat zich dit seizoen het beste omschrijven. Niets bleef mij en mijn vogels bespaard, zo leek het wel. Nu kan er natuurlijk ook vreselijk veel misgaan, maar we zijn zo gewend dat zaken goed verlopen dat we dat als normaal zijn gaan beschouwen. Laten we eens kijken wat mij en mijn vogels overkwam dit seizoen en daar lering uit proberen te trekken. Want; ervaring is iets wat je krijgt net nádat je het nodig hebt!

## **Sterfte**

Al vrij vroeg in het seizoen overleed mijn goede en ervaren kweekvrouw van de Heughlin tapuit en dat terwijl ze op eitjes zat te broeden. Met die eitjes werd het niets meer zo vroeg in het seizoen, met de kweek ook niet meer. Ik had nog wel een reservevrouw met een mismaakt pootje, die ik koppelde aan de man, maar er werd nooit serieus nestbouw overwogen. Heel jammer, maar dit liep op niets uit dit kweekseizoen.

Van de twee paartjes roodkeelbijeneters, gingen er op verschillende momenten twee vogels dood. Koude nachten? Geschrokken van kat of uil? Wie zal het zeggen? Nu waren de overleden vogels beiden mannen en met alleen twee vrouwtjes werd de kweek wel heel erg moeilijk.... Zo waren er direct al drie kweekkoppels uitgeschakeld voor de start van het seizoen. Want om dit soort vogels nog te kunnen verkrijgen op korte termijn bij de aanvang van het broedseizoen is een utopie.

## Onbevuchte eitjes

Mijn eerste jaar met de rode kardinaal. Een prachtige vogel, die ook nog eens bewonderingswaardig mooi fluit. Alleen ging na aankoop van een koppel de man vrij snel dood. Nou ja, een nieuwe man vinden is bij dit soort vogels niet zo moeilijk. Echter ging na enkele weken ook die nieuwe man weer dood. Weer een nieuwe gekocht met de nodige reserveringen. Zouden de vogels medicatie hebben gehad wat mij verzwegen was? Toen in de winter ook het vrouwtje slechter werd en er een vergrote lever zichtbaar werd (de vogels zaten binnen, onverwarmd), zonk de moed in mijn schoenen. Ik ging naar een ervaren kweker van kardinalen, die me aanraade Grog New van Dr. Coutteel te gebruiken. Dit is géén geneesmiddel, maar een preventiemiddel (tegen coccirose en atoxoplasmose) Ook plaatste ik de vogels naar buiten in een volière. Het vrouwtje kwam er langzaam weer bovenop. In het kweekseizoen maakte ze drie keer een nestje met iedere keer drie eitjes, maar allemaal onbevucht! Waarschijnlijk was dit een uitvloeisel van de eerdere problemen, maar toch sta ik nu voor een dilemma. Wat te doen voor komend jaar? Vrouwtje proberen te verkopen en weer een nieuwe kopen (veel moeite en ook weer risico), of het overjarige vrouwtje behouden en hopen op een beter resultaat komend kweekseizoen 2021? (ook risico)



Dode boomkruipers, slachtoffers van de bloedluis

## Niets

Ja, dat kan natuurlijk ook. Er gebeurde helemaal niets bij het jonge (2019) koppel sneeuwkruintapuiten Alles leek in orde. Biotoop volière, diverse verdekt opgehangen nestgelegenheden, goede beplanting, voer, badwater, prima conditie en de man zong ongelooflijk veel en vooral mooi, maar verder "rien de rien" zoals de Fransen zeggen. De man wilde wel, maar het vrouwtje gaf niet thuis. Wat nu? Vrouwtje voor volgend jaar wisselen, of koppel intact houden en gokken op een beter resultaat? Mijn andere koppel deed ook jaren niets voordat er succesvol werd gebroed. Nog eens goed overdenken!



Muizen

## Zwarte luis

Okay, het was bij de kippen, maar dan wel heel veel! Zelfs als ik de eitjes ging rapen, kropen de luisjes over de eitjes heen. Het kippenhok schoonmaken resulteerde altijd in een aanhoudend gekriebel over mijn hele lijf. Dat de broedende kippen hier niet stapelgek van werden is me een raadsel, want ik zag de luisjes zo tussen hun veren lopen. Pas na toepassing van Finetec+ (poeder over het voer en spray voor het hele nachthok), verdwenen de luisjes. Overigens kwam ook hier bloedluis voor, maar daar kom ik nog op terug....

## Bloedluis

Nog nooit heb ik bloedluis bij mijn Europese insecteneters gezien! Tot dit jaar dan.... Mijn al zelfstandige jonge boomkruipers, waar ik erg trots op was, zette ik voor de zekerheid (veiligheid)



Onbevuchte eitjes van de rode kardinalen

binnen in een kooi met ingebouwd licht. Tegen de achterzijde schroefde ik een plaat multiplex, waarop ik stroken boombast had gelijmd, zodat een mooie natuurlijke achterwand ontstond. Alles ging perfect. Totdat ik maanden later de vogeltjes wat dik zag zitten en minder eten opgenomen zag worden. Lusteloos, futloos en dof. Maar toen ik ze ving voor controle, kon ik niets vinden wat als oorzaak kon duiden op deze plotselinge verandering. Niet mager, geen opgezette lever, geen darmlussen, niets van enig bekende ziektebeeld. Echter binnen twee dagen waren al mijn boomkruipers dood. Vreselijk! En nog stond ik met mijn handen in het haar. Ik had werkelijk geen idee wat er mis was. Moedeloos besloot ik om een dag later de kooi schoon te maken en te ontsmetten. Zodra ik de multiplex plaat met schors verwijderde, zag ik echter direct de oorzaak rondkruipen. Bloedluis! En ja, de vogeltjes hadden inderdaad wel licht aangevoeld, maar dat schoot me nu pas weer te binnen... Ze waren compleet leeggezogen! Zelig voor die vogeltjes en zeer spijtig voor mij. Natuurlijk gebeurde dit alles ná het DNA seksen.

## Jongen uit het nest gegoid

Het gebeurde me bij meerdere vogels (roodborsttapuit, boomklever, Europese nachtegaal) dit jaar. Er werd voorbeeldig gebaltst, gekoppeld, gepaard, nest gebouwd eitjes gelegd en gebroed. Alles leek goed te gaan. Totdat de jongen werden geboren. Direct werden ze uit het nest verwijderd. Ik vermoed door het vrouwtje. Ik heb werkelijk geen idee waarom dit gebeurde!? Het resultaat bleef hetzelfde, heel erg jammer!

## Koude nacht

De grote gele kwikstaart staat erom bekend dat hij al erg vroeg begint met zijn eerste legsel. Normaal liggen er einde april al jongen in het nest. Maar dit jaar was dat nog eerder door de extreme warmte (>30 graden Celsius) al vroeg in april. Helaas volgde op deze warme periode een koude periode, waar de temperatuur 's nachts tot het vriespunt daalde. En laat dat nou net de eerste nacht zijn waarop de jonge kwikstaartjes uit het nest sprongen..... Geen bescherming en warmte van broertjes of zusjes in het veilige nest meer, maar alleen en onbeschermd legden ze allemaal het loodje. Er waren geen overlevers van deze eerste jongen. Dan kom je zover en krijg je zelfs met uitgevlogen jongen nog niets op stok. Zuur!

## Onrust

Tja, wat kan er 's nachts allemaal verkeerd gaan? Vogels kunnen schrikken van alle vreemde geluiden en bewegingen, speciaal in de nacht. Ik verloor al eens vogels door een nachtelijk vuurwerk wat door de gemeente werd aangeboden aan de lokale gilde die enkele duizenden jaren bestond geloof ik. Midden in het broedseizoen! Dit jaar was er 's nachts "iets" (uil, kat rat?), waardoor de roodborsttapuit man zijn borstveren verloor, die in een pluk aan de volièredraad hingen (enige stuk met enkelzijdig gaas, nu dubbelzijdig gemaakt, kalf, put, enz.). Met als gevolg een verschrikte vogel die dagenlang onzichtbaar bleef, waardoor het eerste legsel eitjes onbevruucht was. En de man tuinfluiter, die vond ik terug met een gebroken vleugel. Ook al einde kweekseizoen! Ook de kleine plevier (zelfde volièrre als de roodborsttapuit) was dermate geschrokken dat het vrouwtje er een gebroken vleugel aan overhield, terwijl de man op z'n kop in een bosje met biezten belandde. Daar kwam hij in vast te zitten en overleed hij. Wat een drama al zo vroeg in het kweekseizoen! En



Afgekloven nek, spitsmuis aan het werk geweest



Ekster, prachtige vogel, ellendige vogelkiller...

voor al die vogels geldt dat je niet even een andere kunt kopen. Die zijn gewoon niet beschikbaar, zeker niet vroeg in het kweekseizoen.

## Eksters

Met de eksters natuurlijk ook de Vlaamse gaaïen, kauwtjes en kraaien, maar de eksters zijn veruit het brutaalste én de grootste opportunisten. Dit jaar broedde er een paartje in de enorm hoge Douglas den en dan ook nog onbereikbaar hoog in de top. Toen onze Serama kippen kuikentjes hadden, vielen die al snel ten prooi aan de eksters, die zelf hongerige jongen hadden... Ze werden door de draad heen getrokken. In voorgaande jaren gebeurde me dat ook regelmatig met zelfstandige jongen die ik kweekte en apart zette. Ook die werden onthoofd

en de koppen opgegeten. De lijkjes als stille getuigen van een groot drama achter gelaten...

## Waar blijven de eitjes?

Voortvarend ging het koppel Europese tapuit van start. Het had me overigens nog veel moeite gekost om een vrouwtje te vinden bij mijn EK man. Pas na anderhalf jaar lukte het me om een vrouwtje te kunnen kopen in het Verenigd Koninkrijk. Het koppel leek goed te klikken en onder de schuin gezette dakpannen werd eerst een kuiltje in het zand gedraaid, waarna een mooi nestje werd gebouwd. Er werd zelfs gebroed! Alleen zonder eitjes te leggen... Tja, dan is het niet mogelijk om tot nakweek te komen.

*Wordt vervolgd*





# Trosgierst kweken

**Al jaren kweek ik trosgierst (*Panicum milliaceum*) in mijn eigen tuin. Ik ben op het idee gekomen omdat ik onderweg rijen trosgierst tegen kwam in het open veld.**

**E**en liefhebber had drie rijen van zo'n veertig meter lang gezaaid met een zaaimachine. De planten werden 1.20 tot 1.50 hoog en stonden eigenlijk iets te dicht bij elkaar, waardoor de trossen wat kleiner bleven, althans dat dacht ik.

## Aan de slag

Een zaaiblad met 100 vakjes, gevuld met potgrond, en daarin 1 zaadje per vakje. De bruine gierst heb ik gekocht op de vogelmarkt. (de rode gierst heb ik ook geprobeerd, maar deze gaf kleinere trossen, is wat bitter en wordt minder gegeten door de vogels, is mijn ervaring). De tros heb ik op een plat bord gelegd en overheen gewreven, zodat de zaden los kwamen. De grotere zaden heb ik gebruikt. 3 zaadbladen gebruik ik, zodat ik 300 plantjes kweek. Per plant wordt één tros gevormd.

Het zaaien begint bij mij in april; dat gebeurt in een kasje (voortrekken). In mei, na ijsheiligen, worden de plantjes

buiten in de volle grond uitgeplant. De rijen 15 cm uit elkaar en in de rij worden de plantjes zo'n 12 cm van elkaar geplant (ongeveer 50 per m<sup>2</sup>). In totaal plant ik zo'n zes m<sup>2</sup>. Het voordeel van het 'voortrekken' in een kasje is dat de planten dan langere tijd gebruik kunnen maken van het warme weer. Anders komen ze in tijdnood om goed rijp te worden.

## Oogst

Wanneer de trossen goed bruin en rijp zijn worden ze geoogst en in bosjes van tien stuks gebonden en te drogen gehangen in de garage. Zijn ze helemaal droog dan worden ze in een A4-does opgeslagen. Er zijn ook liefhebbers die de trosgierst groen oogsten, dat vinden de vogels ook heerlijk. Het mooie van de kweek is dat ik op het open veld bezig ben, met rondom me vogels en toch geen vogels in mijn aanplant aantref. Anderen met wie ik gesproken heb doen wel gaas over de trosgierst heen. De plant is vrij stabiel en kan best een



windstootje hebben, maar storm is te veel gevraagd. Er zijn veel varianten om trosgierst te kweken; bovenstaande is mijn ervaring en ik heb er goede resultaten mee. Misschien een mooie uitdaging voor u als er een stukje tuin over is.

Succes, Ben Zwetsloot



Bruine spitsstaartamadines worden nog wel een verward met de mokkabruine

# Spitsstaart- amadine

Bruin en Mokkabruin



**Men stuurt ze dan op een tentoonstelling in als isabel. Vaak zijn het poppen van bruine die omdat ze geslachtsgebonden recessief vererven er zomaar ineens als nakweek tussen kunnen zitten. Dat komt omdat er ergens ooit eens een bruine vogel die als isabel is aangeschaft in de kweek is ingezet.**

Tekst en foto's: HENK DE VOS

## **Roodsnavel bruine man**

Een goede bruine vogel is goed te herkennen aan de bruine tekening van kin-  
vlek, broektekening en staartkleur.





### Mokkabruin en bruine man

Een mokkabruine is eigenlijk al direct goed te onderscheiden van een bruine door zijn diep zwartbruine tekening en zijn opgebleekte beigebruine lichaamskleur.

De bruine kun je eigenlijk ook wel snel herkennen aan zijn wat opgebleekte rode snavelkleur die nooit zo diep van kleur kan zijn als de wildkleur of de mokkabruine.

Goed van kleur zijnde vogels zijn altijd wel te herkennen maar door het combineren met ander kleurslagen zal de lichaamskleur vaak opleken of net die warme gloed gaan missen.

### Rood- en Geelsnavel bruin

De lichaamskleur van de geelsnavel bruine is net als bij de geelsnavel wildkleur altijd wat kouder van kleur dan de roodsnavel. Hier is goed te zien dat de licht wijnrode gloed bij de geelsnavel ontbreekt. Dit is bekend en mag niet bestraft worden. Weliswaar gebeurt er met de snavelkleur van de geelsnavel niet zoveel in tegenstelling tot die van de roodsnavel bruine. Deze is zoals ik al eerder aangaf nooit zo diep rood als bij de wildkleur en mokkabruin. Hoe weet je nu 100% zeker dat je met bruin te maken hebt? Omdat de bruine geslachtsgebonden recessief vererft en de mokkabruine autosomaal recessief zul je de administratie van je vogelbestand moeten nakijken van hoe kan het dat er ineens een bruine pop word geboren. Mannen kunnen split voor bruin zijn; poppen kunnen alleen de bruine kleur laten zien. Beide geslachten kunnen wel split voor mokkabruin zijn. Dat verklaart ook een beetje als je vreemde kweekuitkomsten krijgt en er ineens een bruine pop uit de paring komt.



### Bruine pop met slecht gekleurde gele snavel

Wat beslist niet gedaan moet worden is roodsnavel bruin koppelen aan geelsnavel. Je krijgt dan een oranjeachtige tussenkleur en eigenlijk voor zowel de roodsnavel als de geelsnavel bruine niet meer geschikt om mee verder te kweken.

## Geelsnavel bruine man

Hier is goed te zien dat de lichaamskleur altijd iets kouder van kleur is dan die van de roodsnavel. Op het moment dat de snavel de neiging krijgt om een meer oranje gloed te laten zien is de lichaamskleur ook wat warmer.

### Omschrijving roodsnavel bruin.

De standaard omschrijft de lichaamskleur als bruin met een licht wijnrode gloed. De tekening onderdelen als zwartbruin en de snavel als rood. Fysiek hoeft de bruine niet onder te doen aan de wildkleur. Bij de bruinmutatie valt steeds weer op dat de verlengde middelste staartpenne slechts zelden voldoende van lengte zijn. In de KTA staat omschreven dat de snavelkleur niet zo diep van kleur zal kunnen zijn als de wildkleur roodsnavel en dat deze met enige coulance moet worden beoordeeld. Een rode snavelkleur is gewenst. Neigt de snavel naar oranje, dan streng straffen bij kleur. De bruine kleur is van een pop minimaal warmer dan de bruine kleur van de man. Het kleurbeeld van de bruine kleurslag dient, meer nog dan bij de wildkleur, vol en intens te zijn met een perfecte kleuregaliteit. Een bleke en vlekkerige kleur van borst, buik, mantel of rug- en vleugel-



dek wordt dan ook streng bestraft bij zowel kleur als bij tekening.

### Omschrijving geelsnavel bruin

Een helder gele snavelkleur is gewenst. Neigt de snavel naar lichtoranje, dan wordt streng gestraft bij kleur. De bruine kleur van een pop is minimaal warmer dan de bruine kleur van de man. Het kleurbeeld van de bruine kleurslag dient, meer nog dan bij de wildkleur, vol en intens te zijn van een

perfecte kleuregaliteit. Een bleke en vlekkerige kleur van borst, buik, mantel of rug- en vleugeldek wordt streng bestraft. Daarnaast zullen de mutanten, door de beperkte reductie van het aantal melaninekorrels, qua complete lichaamskleur een nuance lichter en wat kouder van kleur zijn dan de mutaties bij de roodsnavel spitsstaartamadine. De tint van de geelsnavel is wat kouder / helderder van kleur dan bij de roodsnavel.



## Geelsnavel wildkleur man.

Omschrijving Geelsnavel wildkleur. De geelsnavel wildkleur betreft hier de nominaatvorm van de spitsstaartamadine. Door een beperkte reductie van het aantal melaninekorrels is de

complete lichaamskleur een nuance kouder dan bij de roodsnavel spitsstaartamadine. Bij de geelsnavel dient de snavelkleur diep geel te zijn. De paring van een roodsnavel spitsstaartamadine aan een geelsnavel spitsstaartamadine dient te worden ontraden, daar dit in de nakweek alleen oranjekeurige snavels geeft, die conform de afspraken, bestraft worden. Alle tussenkleuren van licht tot donker oranje zijn fout. De spitsstaartamadine met een oranje snavelkleur wordt gestraft met maximaal 3 punten in de rubriek kleur. Het kleurbeeld van de geelsnavel wildkleur dient vol en intens te zijn, met een perfecte kleuregaliteit. Een bleke en vlekkerige kleur van borst, buik, mantel of rug- en vleugeldek, wordt streng bestraft.

Volgende keer wat over de combinaties van grijs met mokkabruin en bruin. Daar wordt het verschil in de kleurslagen al wat lastiger te herkennen.

# Uit de keuken

In de loop van vijftientig jaar veel liefhebbers bezocht voor 'in de keuken van..' Graag wil ik wat opmerkelijke ervaringen delen met de lezer van 'Onze vogels'. Hopelijk kan de lezer er zijn of haar voordeel mee doen. Tekst: HENK BRANJE, Foto: P. V.D. HOOVEN

## Kijken naar eetgedrag

Cees Colijn uit Sprang Capelle: houdt rekening met het eetgedrag van de verschillende vogelsoorten die je 'in huis hebt'.

De huismus eet bijvoorbeeld heel voorzichtig; hij neemt een meelworm uit de voerbak, gaat hiermee naar het nest, voert de jongen en komt er vervolgens weer eentje halen bij de voertafel. Wil hij dan nog een derde of vierde keer terugkomen, dan is alle spul reeds opgevreten door andere vogels. Tenminste wanneer er meer eters in een volië aanwezig zijn!

Heel anders is het met de zanglijster. Men beweert dat men een jonge lijsters niet groot zou krijgen zonder wormen en dat ze meelwormen niet af kunnen. Volgens Cees wordt het probleem veroorzaakt door het eetgedrag van lijsters. Deze voeren eerst de jongen goed vol met meelwormen en de rest van de wormen eten ze voor zichzelf. Daardoor worden de vogels te fel, krijgen weer broeddrang en laten het nest vervolgens verloren gaan om weer met een nieuw legsel te gaan beginnen. Voer je daarentegen "beperkt" dan kunnen de lijsters niet te veel achter mekaar vreten omdat de meelwormen enkel voor de jongen bestemd zijn. Ze kunnen dan ook met meelwormen heel goed hun jongen grootbrengen.

## Splendidparkieten zwakke vogels?

Splendidparkieten hebben de naam niet zo'n sterke vogels te zijn. Daar is Jan Hodselmans uit Belfeld, kweker van jaarlijks honderden splendidparkieten, het pertinent niet mee eens. Wanneer je deze vogels de juiste verzorging geeft is er niets aan de hand. Je moet er dus niet met de pet naar gooien! Wel is het zo dat splendidparkieten niet goed tegen tocht en niet goed tegen vocht bestand

zijn. Maar daar kan de liefhebber zeker rekening mee houden.

- De vogels mogen beslist niet in de tocht zitten
- Betonnen vloeren voorkómen veel narigheid met worminfecties; splendidparkieten vertoeven immers graag op de bodem van de volië.
- Onder zitstokken kun je draden horretjes maken zodat de vogels niet of nauwelijks in aanraking kunnen komen met ontlasting

Wil je met neophemaparkieten beginnen, dan raadt Jan aan om met Bourk's of turquoiseparkieten te beginnen. Deze soorten zijn wat gemakkelijker qua verzorging en wat minder gevoelig voor tocht en vocht dan splendids.



Roodbuik splendidparkiet,

## Tips voor kanariehouders

### Vogels uit het nest gooien

- Een pop gooit niet zo maar een geringd jong uit het nest. Zij doet dat omdat zij het nest proper wil houden en een ring aanziet voor een stukje vuil dat zij perse uit het nest wil verwijderen.
- Een kanariepop in goed broedrijp is en haar nest klaar heeft, trekt veertjes rond haar cloaca weg en plaatst deze "als versiering" op de rand van het nest. Bij een dergelijk proper popje dat veel aandacht aan haar nest besteed heeft moet je oppassen met ringen.
- Strooi wat zilveren stukjes van de Kerstboomslingers rond de rand van het nest. De eerste twintig zal de pop wel opruimen, maar op een gegeven moment is ze het wel zat.
- Smeer de ringen in met glycerine. Dit spul heeft een smerige smaak.

- Rijg enkele ringetjes door een vissnoer en bevestig dit aan de rand van het nest. Na twee weken broeden is de pop waarschijnlijk uitgekeken op en bekend met het verschijnsel ring. De kans dat ze de ringen van de jongen met rust laat zal hierdoor sterk toenemen.

### Eitjes repareren

- Mogelijk al vaker gehoord? Indien het eivlies niet kapot is helpt kleurloze nagellak vaak prima. Tenminste wanneer de breuk niet bij de luchtkamer zit.

### Kunsteitjes

- Gebruik je nieuwe kunsteitjes? Deze hebben vaak een scherp puntje (ontstaan tijdens de fabricage). Dit puntje moet je dus wegschuren, omdat een eitje hierdoor vlot beschadigd kan worden.

**Net als de overige soorten uit het geslacht neophema vragen turquoiseparkieten relatief weinig ruimte. Daardoor zijn ze ook zeer geschikt voor klein behuisde liefhebbers.**

Tekst en foto's ADRI VAN KOOTEN



# *Turquoiseparkiet*

## *Neophema pulchella*

Man

**T**urquoisineparkieten zijn vertrouwelijke vogels die vrij tam kunnen worden en geen bijzondere eisen stellen aan hun verzorging. Een ander positief punt is dat ze niet vernielzuchtig en lawaaiërig zijn. Het geluid dat ze produceren is zacht en welluidend. Ze zijn vaak op de bodem van de volière te vinden op zoek naar voedsel. Dit maakt ze wel gevoelig voor worminfecties.

### Herkomst en leefwijze

De 22 cm grote turquoiseparkiet komt voor in Oost-Australië vanaf Centraal-Queensland tot iets over de grens met Victoria. Hij houdt zich bij voorkeur op in heuvelachtige, dichtbeboste streken maar zoekt ook wel naar graszaden in weilanden of op gras- en sportvelden. De voeding bestaat voornamelijk uit zaden van grassen en allerlei wilde kruidachtige planten die ze op de grond vinden. Verder eten ze vruchten, bloesemnectar, bladknoppen en diverse soorten insecten en hun larven.

### Huisvesting

Turquoiseparkieten kunnen het best per paar in afzonderlijke vluchtjes worden gehuisvest. Een prima onderkomen voor deze vogels is een volière met een afmeting van 2 x 0,90 x 2 m en een droog, tocht- en vorstvrij nachtverblijf van bijvoorbeeld 1 x 1 x 2 m. Ook zijn er liefhebbers die met turquoiseparkieten kweken in ruime broedkooien van 120 x 50 x 50 cm. Zelf houd ik (AvK) het liever bij kleine vluchtjes omdat huisvesting in broedkooien al snel kan leiden tot vervetting. Indien wordt voldaan aan de hierboven beschreven huisvesting is het goed mogelijk turquoiseparkieten in een onver-



warmde volière te houden. Net als voor alle neophema's geldt dat deze vogels gevoelig zijn voor koud en vochtig weer. Wanneer deze weersomstandigheden zich voordoen is het beter de vogels (tijdelijk) binnen te houden omdat er anders gemakkelijk slachtoffers vallen!

### Voeding in avicultuur

De voeding van deze vogels dient te bestaan uit een zaadmengsel voor neophema's. Hiernaast verdient het aanbeveling hen elke dag een mengsel van kiemzaad en eivoer te verstrekken in de verhouding 1:1. Als er jongen zijn is het belangrijk dat ze de beschikking hebben over dierlijke eiwitten. Het eiwitpercentage van het krachtvoer moet dan ongeveer op 20% liggen. Omdat de meeste commerciële eivoeders dit eiwitgehalte niet halen is het verstandig dit aan te vullen. Verder dient drie à vier keer per week fruit en groenvoer te worden verstrekt. Ook het regelmatig geven van (onbespoten) halfrijpe gras- en onkruidzaden is zeer aan te bevelen. Deze kunnen met een heggenschaar worden geknipt en ingebonden in grote bossen worden opgehangen. Naast bovenstaande voeding is het verder noodzakelijk dat de vogels dagelijks kunnen beschikken over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit), maagkiezel en sepia(schelpen) niet ontbreken.

### Kweek

Er kan een nestblok worden verstrekt met een bodemoppervlak van 18 x 18 cm, een hoogte van 40 cm en een invlieggat van 6 cm doorsnee. Het is verstandig meerdere (verschillende) blokken te verstrekken zodat de vogels zelf hun keuze kunnen maken. Ze kunnen zowel in de volière als in het nachtverblijf worden opgehangen. Buiten moeten ze wel worden beschermd tegen slagregens en felle zonneschijn. Als nestmateriaal kan gebruik worden gemaakt van een laag rottend hout, houtspaanders of zaagsel dat vermengd wordt met boshumus, potgrond of turf. Net als bij de meeste parkietensoorten verdragen meerdere paartjes elkaar niet tijdens het broedseizoen. Vooral de mannen beginnen, wanneer ze broedrijp zijn, op elkaar te jagen. Indien men een goed kweekstel treft of samenstelt zal de pop al snel overgaan tot het leggen van eieren. Na een broedduur van ongeveer 20 dagen worden de jongen geboren. De man komt de pop tijdens het broeden voeren en doet dit later ook bij de jongen. Ringmaat: 4 mm.

Een paartje kan in een seizoen twee broedsels grootbrengen. De jongen die na ongeveer vier weken het nest verlaten zijn nogal wild. Ze verwonden zich dan ook snel aan gaas, draden of wanden. Onderschat dit niet want zelf heb ik mijn beginja-



Pop

ren ervaren hoe een jonge turquoisineparkiet zich doordvloed tegen het gaas. Om verwondingen te voorkomen is het verstandig planten tegen de wanden te zetten en groene takken in het gaas te steken wanneer ze op het punt staan uit te vliegen. De jonge vogels lijken op de pop maar zijn wat matter van kleur. Nadat ze zijn uitgevlogen worden ze nog twee tot drie weken door de oudervogels (bij)gevoerd alvorens ze zelfstandig zijn.

### De (wildkleur) turquoisineparkiet als tentoonstellingsvogel

De volgende punten zijn belangrijk wanneer je met turquoisineparkieten naar de wedstrijd wilt:

**Conditie:** Conditie is een eerste vereiste dus is het van belang dat de vogels die we inbrengen een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken.

**Formaat:** De lengte van een turquoisineparkiet dient ongeveer 24 cm. te zijn. Hierbij bepaalt de staart voor ongeveer 40% de totale lengte.

**Model:** Een ideale turquoisineparkiet is een volle vogel waarbij de borstbevedering de schouders

bedekt (Bij te smalle vogels valt de borst als het ware tussen de schouders). De nek moet goed gevuld zijn. De ruglijn dient, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn te vormen. Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

**Houding:** Turquoisineparkieten met een juiste houding zijn vogels waarbij de ruglijn een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

**Kop:** De turquoisineparkiet dient een ronde kop te hebben met een iets afgeplatte schedel.

**Poten:** De vogel dient vrij te zitten van de zitstok. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

**Snavel:** De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm. over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

**Bevedering:** De bevedering dient compleet te zijn, dicht en aaneengesloten. De vleugels dienen strak langs het lichaam gedragen te worden en mogen elkaar op de rug niet kruisen.

### Tentoonstellingseisen groene man

**Kleur:** De borstkleur van de turquoisine man moet helder diep geel zijn. Jonge mannen laten vaak nog een groene waas op de borst zien. De omzoming van de onderste dekveren moet egaal donkergroen zijn.

De buikkleur moet zuiver geel zijn, zonder enige rode aanslag. Vooral tussen de poten is dit nog wel eens het geval. Verder moet de donkergroene lichaamskleur egaal zijn en niet vlekkelig overkomen.

**Tekening:** De omzoming op de borst moet



duidelijk, scherp en regelmatig aanwezig zijn. Op de buik is dit vager. De rode vleugelbalk moet strak zijn afgeijnd. Wanneer de vogel in rust zit, verbergt hij de vleugelbalk vaak. De rand van de vleugelbocht dient donkerblauw te zijn, overgaand in diep ultramarijn blauw. Het masker van de man dient rond de snavel en op de schedel diep ultramarijn blauw te zijn en in de wangen diep hemelsblauw.


### Tentoonstellingseisen groene pop

**Kleur:** Bij de pop dient de borstkleur egaal diep grasgroen te zijn. Veel poppen laten hier een te lichte kleur zien terwijl het geel van de buik dan ook nog vaak door loopt in de borst. De buik moet zuiver geel zijn, zonder enige rode aanslag. Het tonen van rode veertjes op het vlegeldek is fout (man kenmerk).

**Tekening:** Op de borst moet een duidelijke omzoming aanwezig zijn, die een regelmatig verloop heeft. De afscheiding borst/buik moet strak zijn, zonder (gele of groene) uitlopers in de borst of buik. Het masker van de pop hoort donkerblauw te zijn. Een kenmerk van de poppen is dat deze een geelachtig witte teugelstreep tonen tussen snavel en oog.

### Bijzonderheden

Bij de turquoisineparkiet zijn, voor zover bekend, de volgende mutaties ontstaan: rijs, donkerfactor, violet, opaline, cinnamon, turquoise, bronze fallow, pale fallow, dilute (overgoten), SL ino, faded, misty, mottle, dominant bont, recessief bont en melanistic. Van sommige mutaties, vanaf SL ino tot en met melanistic, zijn slechts enkele exemplaren bekend.





**Hoewel ik in de stad woon en een piepklein tuintje heb, krijg ik aardig wat vogels op visite.** Tekst en foto's MARIJ DE VOS

# Mijn tuintje



Roodborst

**I**n de loop der jaren heb ik mijn tuin steeds meer vogelvriendelijk gemaakt. Dat loont zich, wat wel te zien is aan mijn bonte verzameling vogelplaatjes!

Toen ik mijn huis betrok was de achtertuin zo'n beetje dichtgemetseld. Langzaam maar zeker ben ik steeds meer stenen gaan verwijderen en in de ontstane ruimte zwarte aarde en planten gaan zetten. Daarmee creëer je meer beschutting voor vogels en als

je een beetje oplet en vogelvriendelijke planten poot geef je ze ook voedsel in de vorm van bessen en andere vruchten. Bladluis, vroeger een gehate vijand, laat ik nu zitten, onder andere koolmezen en pimpeltjes zijn er gek op en ze zijn goede bron van eiwitten voor de jongen. Ik haal mijn pindakaas bij de Action of ik koop ZOUTLOZE gewone pindakaas. Bij de plaatselijke dierenwinkel haal ik een 20 kilozak zaad voor vogels in de tuin. (Die kost ongeveer 20 Euro, stukken goedkoper dan los vogelzaad!)

Als je de pot pindakaas opgehangen hebt en het zaad in een huisje of op een plateautje gelegd hebt hoeft je nog maar één ding te doen: rustig afwachten met je camera op scherp.

Vogels mag je het hele jaar voeren (zie Vogelbescherming Nederland). Geef alleen nóóit zoute producten. Vogels zorgen er zelf voor dat er voldoende variatie in hun dieet zit. Op internet is ruim voldoende informatie over vogelvriendelijke bloemen en planten.



Ekster



Ekster



Heggenmus



Grote bonte specht



Houtduiven



Voertafel



Jonge koolmees



Jonge merels



Jonge tjiftjaf



Kauw



Koolmees



Meeuw



Wilde eend



Pimpelmees



Roodborst



Spreeuw



Spreeuw



Turkse tortel



Turkse tortels



Boekvink



Huismus



Vlaamse gaai



Wilde eend



## Keurmeester nr. (120)

**Daar sta je dan** als liefhebber in het vogelhok. Met juist dit jaar leuke vogels voor een wedstrijd. Eindelijk dat resultaat waar je misschien wel jaren geduldig naartoe hebt gekweekt. Waar je andere jaren rond deze tijd (begin oktober) volop in de selectie zit, boventallige vogels verkoopt en de beoogde topstukken traint, zit je dit jaar met de handen in het haar.

Als keurmeesters lopen wij ons in september, oktober warm voor het aanstaande keurseizoen. Het Technisch Bulletin met de laatste keurtechnische wijzigingen verschijnt. Keurmeesters komen nog een keer bij elkaar om de horloges zoveel mogelijk gelijk te zetten, zodat ze goedbe-slagen het gladde ijs van het keurseizoen betreden.

De maatregelen om het coronavirus binnen de perken te houden trekken een zware wissel, ook op onze liefhebberij. Is wat lucht in de agenda de eerste weken nog wel leuk; als keurmeester mis ik al snel de avonden met de gespreksgroep, de studiedagen in Apeldoorn en het contact met andere keurmeesters. Onderling een vogeltje ruilen en het er even met elkaar over hebben; het aantal keuringen, of het met de kweek een beetje wilde vloten en soms over persoonlijke zaken. Dat valt dit jaar allemaal weg.

Het bestuur van de Keurmeestersvereniging drukte de keurmeesters vroegtijdig op het hart dat wie gezien de omstandigheden niet wilde keuren, daartoe niet verplicht werd. Uit een enquête bleek overigens dat

verreweg het merendeel van de keurmeesters, mits de nodige voorzorgsmaatregelen waren getroffen, best bereid waren te komen keuren. Maar al in de zomermaanden werden de eerste keuringen afgezegd. De districtstentoonstellingen volgden en zelfs door Vogel 2021 ging een streep.

De vrees bestaat dat liefhebbers door het wegvallen van de routine de vogelsport vaarwel zullen zeggen. Omdat ze ervaren dat het ook wel rustig is. De vogeltjes en alles wat daarmee samenhangt toch niet zo onmisbaar blijken als altijd wel werd gedacht. Die mensen zullen er zijn; er zullen als gevolg van de coronacrisis liefhebbers afhaken. Anderzijds zullen er wellicht ook juist mensen zijn die de liefhebberij (weer) oppakken omdat ze aan huis gebonden zijn. Ontdekken dat juist bij een pandemie, wanneer zoveel andere dingen niet door kunnen gaan, de vogelhouderij dicht bij huis een bevredigende bezigheid kan zijn. Dat in het vogelhok de anderhalve meter samenleving niet geldt.

De verwachting is dat voor het tentoonstellingsseizoen 2021-2022 een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar zal zijn. Dan kunnen we elkaar weer ontmoeten. Houd voor ogen dat de vogels van dit kweekjaar ook volgend jaar nog op de shows worden gevraagd. Laten we de veerkracht tonen om er dan weer te staan. Omwille van elkaar en de vogelsport.

Louis van Kelckhoven  
keurmeester

## ADVERTENTIES





**Volièrebouw Saman**  
**voor al uw volièrès, hokken en kooien**

Wij leveren uit voorraad. U kunt gaan voor zelfbouw compleet of met losse panelen als bouwpakket. Ook verzorgen wij de complete montage indien gewenst. Antraciet, zwart, groen, geanodiseerd en brute + aluminium hebben wij in het programma. Gaas in diverse maten, kleuren en draaddikte, op maat geknipt na walsen. Diverse soorten en maten plaatwerk zoals kunststof, acp, plexiglas, polycarbonaat en sandwichpanelen om dichte kooien en geïsoleerde nachthokken te maken. Voor meer informatie kijk op: [www.volierebouwsaman.nl](http://www.volierebouwsaman.nl) en bel of mail ons.

KRUISPAD 14 | 4891 RJ RIJSBERGEN  
06 51 14 55 25  
INFO@VOLIEREBOUWSAMAN.NL  
WWW.VOLIEREBOUWSAMAN.NL

### KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift, pagina's boordevol informatie over vogels. Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 38,- via een Europese overschrijving bij de KBC bank. Het IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en BIC code = KREDBEBB t.n.v. KBOF - Van Paesschen François, Molenheide 8, te B-2870 Puurs. Alle leden ontvangen maandelijks het clubblad van de KBOF, **de witte spreeuwen**. Inschrijvingen en gratis proefnummer op aanvraag bij Achten Paul, Evelaarstraat 78, B 9160 Lokeren België.

**E-mail: ledenadministratie@kbof.be**  
**Bezoek onze website <http://www.kbof.be>**



Voor al uw vogelbenodigheden

**WIM VAN DE LUSTGRAAF**

[www.wimvandelustgraaf.nl](http://www.wimvandelustgraaf.nl)



### Vogelliefhebbers in Nederland

Goed nieuws over 'DE VOGELWERELD' A.O.B.

Steeds meer Nederlandse liefhebbers willen een abonnement op het tijdschrift 'De Vogelwereld' van A.O.B. Speciaal voor die mensen heeft het bestuur een speciale regeling uitgewerkt. Nederlandse liefhebbers kunnen voortaan door slechts 37 euro te storten op het rekeningnummer BE05 7390 1147 2875 – BIC GEBA BE BB een jaar lang ons tijdschrift ontvangen. Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de betaling. Een digitaal proefnummer kan aangevraagd worden op [g.van.peteghem@telenet.be](mailto:g.van.peteghem@telenet.be)

'De Vogelwereld' verschijnt 11x per jaar. 9x op 48 blz. A4 en 2x op 64 blz. A4. Uw kan een gratis proefnummer downloaden van [www.aobbel.be](http://www.aobbel.be)



**Vogelboekhandel J&J**

Kijk voor ons ruime assortiment vogelboeken op onze vernieuwde website:

[www.vogelboekhandel.nl](http://www.vogelboekhandel.nl)

# Damarensis

## 9.0. Poicephalus meyeri damarensis (Neumann 1898)

Tekst en foto's: RINUS VAN DEN BROEK

### 9.1. Soortbeschrijving

**Kop, nek, en borstkleur:** donker grijsbruin, rond het oor iets lichter.

**Rug, vleugel- en bovendekstaartveren:** donker grijsbruin met een olijfgroene waas.

**Buikkleur:** donkerblauw, getekend door zwartgrijze veertjes. Poppen zijn hier meestal iets egalier.

**Koptekening:** weinig tot geen geel op de kop.

**Vleugelbocht & onderdekvleugelve- ren:** geel, vorm en grootte van de gele schouderlekken variabel.

**Aars en onderstaartbevedering:** geelgroen, met helderblauwe veren afgedekt.

**Dijbeen bevedering:** lichtblauw met nog een klein beetje geel.

**Stuit:** diep helder blauw.

**Snavel:** zwart, aan de basis van de bovensnavel iets lichter.

**Poten:** zwartgrijs, nagels zwart.

**Pupil:** zwart; iris roodbruin

**Lengte:** 23 centimeter

### 9.2. Verspreidingsgebied

Komt voor van het noordwesten van Botswana waar hij samen voorkomt met de *P.m.transvaalensis*, het westen en centraal Namibië en het zuiden van Angola waar hij samen voorkomt met de *P.m.reichenowi*. (Forshaw, 2006)

### 9.3. Het jeugdkleed

Het jeugdkleed van de *reichenowi* wijkt op diversen punten af van een volwassen vogel.

**Kop, nek, en borstkleur:** flets grijsachtig bruin.



Man, vier jaar oud



Man, 4 maanden oud

**Rug en vleugeldek:** warm grijsbruin, vleugeldekveren hebben een blauwgroene omzoming.

**Buikkleur:** blauw, vaak enigszins getekend door bruine en/of gele veertjes.

**Koptekening:** geen.

**Vleugelbocht & onderdekvleugelve- ren:** lichtgeel met redelijk veel bruin en groen er door; vorm en grootte van deze schouderlekken variabel.

**Iris:** flets roodbruin.


De jongen lijken in hun jeugdkleed meer geel te hebben in de grijsbruin gekleurde delen op kop en het rugdek. Sommige laten dan zelf een gele tekening op de buik zien!

Kop, nek en rugdek zijn fletser van kleur. De vleugeldekveren hebben een blauwgroene omzoming.

De stuitkleur moet nog egalier van kleur worden.



Binnenzijde van vleugelbocht



Stuitkleur



IN DE KEUKEN VAN

Bep



Crouzen

TE WIJCHEN

**Een vrouwelijke vogelliefhebber, een witte raaf? Een vrouwelijke keurmeester, met een lampje te zoeken? Bep Crouzen uit het Gelderse Wijchen is beiden.** Tekst en foto's: HENK BRANJE



Man kleine Cubavink.

### Dierenvriend

Thuis hadden de ouders een boerderij. Als huisdieren hadden ze onder andere konijnen en krielen waar Bep altijd veel mee bezig was. Vogels waren destijds nog niet in beeld. Dat gebeurde pas toen Bep getrouwd was en reeds jonge kinderen had. Dat kwam door de buurman....

De buurman had een voliëre voor z'n zoon gebouwd waarin allerlei vogeltjes gehouden werden. Dat leek Bep wel iets. Toen ze tegen haar buurman had laten vallen dat zij ook wel zo iets zou willen hebben kwam deze met het voorstel om een kooi voor haar te timmeren. Die belofte maakte hij waar, en de kooi, zo'n meter breed en zestig centimeter diep was in no-time klaar. Ze stond in de zomer buiten onder het afdak en verhuisden in de wintermaanden naar binnenshuis.

In die kooi werden tropische vogeltjes gehouden, waaronder zebrevinken. Toen deze met allerlei materialen begonnen te slepen leek het Bep toch ook wel leuk om de vogels de gelegenheid te geven om daadwerkelijk te gaan broeden. En met zebrevinken ging dat snel, te snel.... Daarom zocht ze al vrij snel naar iets meer uitdagends. En... werd er een grotere voliëre gebouwd, compleet met nachthok. En werd begonnen met onder andere Afrikaanse prachtvinken. De voliëre is in de loop der jaren steeds wat vergroot en toen de kinderen zo groot waren dat ze niet meer in de zandbak speelden, werd de rand van de betreffende zandbak de fundering van een tweede voliëre.

### Huisvesting

Bep beschikt, zoals hierboven vermeld, over twee voliëres. Een grotere over ongeveer 5 bij 1.50 meter met aansluitend een nachthok. De tweede voliëre is wat kleiner en heeft geen

nachthok. Beide voliëres zijn helemaal overdekt zodat de voliëres goed droog blijven. Aan de zijkanten is er volop groen aangeplant dat ondanks de overkapping voldoende vocht van buiten krijgt. De vogels hebben het er goed naar de zin.

Eind oktober, begin november verhuizen de vogels van de voliëres naar het tuinhuis. Dit wordt in de winter verwarmd tot zo'n 15 graden Celsius.

In het tuinhuisje zijn enkele kleine vluchten gemaakt en verschillende broedkooien waar de vogels prima in kunnen overwinteren.

### Voeding

De tropische vogels krijgen zadenmengeling 234 van Teurlings; het is een exotenmengeling met relatief veel kleinere zaden en daarom heel geschikt voor kleinere exoten. Zijn de zaden namelijk te groot, dan zijn ze niet te pellen door kleine exoten als

oranjekaakjes en tijgervinkjes.

Het eivoer, Orlux voor exoten, wordt 'aangepast' door Bep: 1/3 Orlux + 1/3 beschuit + 1/3 bambix/nutrix. Tien eetlepels van dit mengsel wordt rul gemaakt met behulp van een gekookt ei. Vervolgens worden er geweekte (dus niet gekiemde) zaden onder gemengd.

Hebben de vogels jongen, dan worden er diepvries pinkies, diepvries buffalowormpjes of diepvries rode muggenlarven onder gemengd (deze zijn uiteraard van tevoren eerst ontdood). De rode muggenlarven worden gekocht bij een hengelsportzaak.

Verder krijgen de vogels dagelijks onkruidzaden (zelf geplukt tijdens het uitlaten van de hond), trosgierst en wat groenvoer (witlof, vogelmuur). Tenslotte hebben de vogels altijd de beschikking over gemalen eierschalen.

Jaren lang heeft Bep, wanneer de vogels jongen hadden, dagelijks met haar schepnetje watervlooien gevangen langs de vijvers. Wijchens meer. Erg gewild levend voer voor Afrikaantjes met jongen.

### De kweek

Eind april, begin mei, afhankelijk van de weersgesteldheid, worden de vogels uit het tuinhuis naar de voliëres overgebracht. Er worden dan meteen nestgelegenheden aangebracht (rieten korfjes) en nestmateriaal aangeboden (bruine en witte sisal, lange grasstengels en duivenveertjes). Met name de vuurvinkjes zijn dol op duivenveren. Wanneer het mooi weer is beginnen sommige vogels al direct met het verslepen van nestmateriaal. Doorgaans weet Bep elk jaar weer een >



Abessijnse astrilde



Man granaatastrilde



Pop granaatastrilde

› mooie serie jongen op stok te krijgen. De ene keer wat meer van de ene soort, de andere keer wat meer van een andere soort. Het afgelopen jaar hebben met name de kleine cubavinken, de vuurvinkjes en de geelborstcini's het goed gedaan. De Sint Helenafazantjes hadden enkel onbevuchte eitjes en de granaatastrilden hadden één jong dat helaas gestorven is tijdens de opfok. Tijdens het bezoek van ondergetekende hadden de blauwfazantjes vier goed groeiende jongen en ook de kleine cubavinken hadden nog een nest met kleintjes terwijl de vuurvinkjes bevruchte eieren hadden.

### Succes van Afrikaantjes kweken

Volgens Bep heeft ze bij het kweken van Afrikaantjes veel te danken aan het voeren van 'witte wormpjes', officieel enchytreëen geheten. Ze kweekt deze wormpjes zelf in grote zwarte bloempotten. Ze heeft het kweken van de witte wormpjes geleerd

van een keurmeester-mentor tijdens haar opleiding tot keurmeester. De bloempotten worden helemaal gevuld met potgrond of biggencompost. De wormpjes die je nodig hebt zijn te vinden onder vochtig blad in het bos. De wormpjes krijgen een eigengemaakte voeding bestaande uit restjes sla en haverhout die iets aan de kook gebracht wordt; daar wordt een klontje boter aan toegevoegd. Dit mengsel wordt, als het uitgehard is, in een gat in de grond gestopt en vervolgens afgedekt. De wormpjes groeien er goed op! Het is belangrijk om de grond vochtig te houden.

Na 'n paar weken hebben de wormpjes zich flink vermeerderd en kan zo'n bloempot in z'n geheel in de volière geplaatst worden wanneer de Afrikaantjes jongen hebben. Met een lepel wordt de aarde wat omgezet zodat de wormpjes tevoorschijn komen. Omdat deze lichtschuw zijn zullen ze zo vlug mogelijk weer onder de grond

verdwijnen, buiten bereik van de gretige vogelsnavels. Maar ze moeten vlug zijn, want de vogels zijn er dol op en vliegen meteen op de bloempot af wanneer Bep er met een lepel door geroerd heeft. Wanneer de vogels jongen hebben wordt enkele keren per dag de grond in de bloempot los geroerd. In het 'hoogseizoen' wordt er minstens in vier bloempotten enchytreëen geteeld.

### Huidige collectie

In de twee volières wordt een prachtige collectie vogels gehuisvest: Mozambique sijzen, geelborstcini's, kleine cubavinken, granaatastrilden, vuurvinkjes, Abessijnse astrilden, tijgervinkjes, oranjekaakjes en blauwfazantjes. De vogels leven in pais en vree en van onderlinge agressie is geen sprake.

Doorgaans wordt vrij goed gekweekt en ook het afgelopen jaar heeft Bep redelijk gekweekt: ze heeft geelborstcini's, Sint Helenafazantjes, goudbukjes, vuurvinkjes en kleine cubavinken op stok gekregen.

### Keurmeester

Veel tropenliefhebbers zal de naam Bep Crouzen misschien bekend voorkomen. Dat kan kloppen, want Bep is al bijna dertig jaar keurmeester exoten. In al die jaren heeft ze honderden keuringen verricht in den lande. Ze was destijds een van de eerste vrouwelijke keurmeesters en ..... is nog steeds een van de weinige vrouwen in de keurmeesterwereld.

Toen ze nog niet zo lang lid was bij de vogelvereniging van Wijchen werd ze uitgenodigd om vogels voor te dragen tijdens de keuring van de onderlinge. Daar maakte ze kennis met het werk van een keurmeester. En dat keuren vond

Bep bij haar volière







Granaatastrildes op zoek naar enchytreën

ze, na 'n paar jaar vogels aangedragen te hebben toch veel interessanter. Ze informeerde bij de N.B.v.V. Er waren op dat moment plannen om een cursus voor exotenkeurmeester op te starten. Daar was toen veel interesse voor: zo'n zestig (!! ) liefhebbers meldden zich aan voor de Open Dag in Breda. Er werden 46 cursisten aangenomen voor de tweejarige cursus waaronder Bep; 25 cursisten slaagden uiteindelijk als keurmeester exoten. Na het behalen van het keurbrevet exoten werd de vervolgcursus parkieten met succes gevolgd. Met gemiddeld meer dan twintig keuringen per jaar heeft keurmeester Crouzen nogal duizenden vogels op de keurtafel gehad. Van die vijftig keurmeesters zijn er nu, bijna dertig jaar later, nog zo'n vijf van over. Overigens zal Bep in het keurseizoen '20-'21 voor het laatst achter de keurtafel gaan plaats nemen. Daarna stopt ook zij met keuren.

### Vogelshows

Met haar vogels werd jarenlang deelgenomen aan vogeltentoonstellingen. In de eerste plaats natuurlijk aan de onderlinge, vervolgens de gecombineerde show te Nijmegen. Ook de Districtshow van Gelderland stond op het programma en uiteraard de landelijke show te Breda en vervolgens Apeldoorn en Zwolle. Bep heeft 'n paar keer meegedaan aan de wereldshow en telkens met succes. In 2019 werden een gouden en twee zilveren medailles behaald met een goudbukje (goud) en de kleine cubavinkjes.

### Afrikaantjes iets voor beginnende liefhebbers?

Nou, het zijn niet bepaald de eenvoudigst te houden vogels. Met name de voeding tijdens het broedseizoen wanneer de vogels jongen hebben is niet eenvoudig. Een foutje is zo gemaakt en bij de huidige prijzen van Afrikaanse prachtvinken kun je beter ervaring

opdoen met wat eenvoudiger te houden soorten als zebra vinken of Australische prachtvinken. Niet dat de liefhebbers die deze vogels houden elk jaar 'stapels' jongen kweken, maar ze zijn wat verzorging betreft net iets gemakkelijker. Denk je voldoende ervaring te hebben, begin dat met wat koppeltjes Afrikaantjes zoals tijgervinken, oranje kaakjes of goudbukjes. En wil je meer informatie? Er is binnen de Bond een speciaalclub voor Afrikaanse prachtvinken, een club van enthousiaste liefhebbers die je altijd kunnen bijstaan met adviezen.

### De toekomst

Bep gaat na het aanstaande wedstrijdseizoen stoppen als keurmeester. Ook twijfelt ze er aan of ze nog lang met haar vogelhobby blijft doorgaan: de jaren gaan immers tellen bij Bep die inmiddels de mooie leeftijd van 77 heeft behaald. Van eega Hans die haar al die jaren heeft gesteund in haar hobby mag ze in ieder geval nog gerust doorgaan.



Man blauwfazant



Man mozambique sijs



Witzaad: wordt ook platzaad of gewoon kanariezaad genoemd. Het behoort tot de familie van de grassen. Witzaad is een ideaal basisvoer voor kanaries. Het is rijk aan zetmeel en bevat relatief weinig vet. Liefhebbers die elk jaar af te rekenen hebben met vogels die te vet zijn, doen er goed aan om aan hun zak kanariemengeling een halve zak witzaad toe te voegen, zeker in de rustperiode

# Voer voor vogels

**In de handel zijn veel soorten vogelvoer te koop. Er zijn verschillende merken, een grote keuze aan samenstellingen en verschillende prijzen.**

Tekst: MARC DEVOS

**E**r zijn mengsels met pellets, er zijn er zonder raapzaad; er bestaan kweekmengelingen, ruimengelingen, mengelingen voor in de rustperiode enzovoort. Daarnaast zijn er nog allerhande losse zaden beschikbaar.

Ik ga u gewoon vertellen welke voeding ik dagelijks aan mijn kanaries geef, het hele jaar door. Verwacht van mij geen opsomming van alle stoffen die in de voeding aanwezig zijn zoals eiwitten, koolhydraten, vetten en aminozuren. Neen, zeker niet, want dan zou ik mij begeven op het terrein van de voedselkundigen en daartoe behoort ik zeker niet.

Ik heb nooit geloofd dat de samenstelling van het voer zo nauw komt als men wil doen geloven. Je kunt fouten maken, natuurlijk. Voer kan te vet zijn of te eenzijdig. Maar niemand maakt

me wijs dat het op enkele procenten meer of minder van een bepaald zaad aankomt. Teveel goede liefhebbers voeren te verschillend om te geloven dat er zoiets bestaat als een ideale samenstelling. En zelfs als die zou bestaan, dan nog kiest elke vogel er de zaden uit die hij/zij verkiest. Alleen van vogels die uitsluitend met pellets gevoerd worden kent men met quasi zekerheid de juiste voersamenstelling.

**Geen standaardvoeding**

Hierbij mogen we niet uit het oog verliezen dat de voedselbehoeften per jaargetijde verschillen. Met andere woorden: een broedende vogel, een vogel die jongen moet verzorgen of een ruiende vogel heeft een andere voedselbehoefte dan een doorsnee vogel door het jaar. Dus van een standaardvoeding het hele jaar door kan geen sprake zijn.



Raapzaad. Is royaal in de handelsmengsels aanwezig omdat het goedkoop is. Het is een prima zaad met een hoge voedingswaarde en een perfect aminozurenpatroon. Het heeft één nadeel: het is erg vet. Dus met mate te gebruiken. Koolzaad wordt door veel liefhebbers minder gewaardeerd, maar heeft precies dezelfde voedingswaarde.



Lijnzaad: zaad van de vlasplant. Bevat hoge hoeveelheden omega-3-vetzuren. Het is slijmvormend en bevordert hierdoor de spijsvertering.



Nigerzaad.  
Een waardevol zaad dat in de standaardmengsels maar matig aanwezig is, vanwege zijn duurdere prijs. Het wordt door kanaries heel graag gegeten.

### Lekker ruiken

Kanaries hebben maar een beperkte reukzin. Eivoer met sinaasappelaroma ruikt lekker voor de kweker, maar onze vogels gaan er echt niet beter door voeren. Ze beschikken ook maar over weinig smaakpapillen. Toch weet elke liefhebber dat kanaries een duidelijke voorkeur voor bepaalde zaden hebben. Maar een vogel laat zich meer leiden door grootte, vorm, hardheid van het zaad dan door de smaak.

Welk merk u voert, daar bemoei ik mij niet mee en ik heb er ook geen behoefte aan om reclame te maken voor een bepaald merk. Alleen wil ik u er even op wijzen dat vogels die in een buiten volière gehuisvest zijn die aan grote temperatuurverschillen blootgesteld zijn zoals zon, regen en kou, hogere eisen stellen aan het voedingspakket dan vogels die in een verwarmde ruimte gehuisvest zijn. Altijd het duurste voer kiezen is zeker

niet nodig, maar wanneer je wil besparen ten koste van de vogels, dan is het beter om met de hobby te stoppen. Onze vogels zijn volledig van ons afhankelijk en daarom is alleen het beste goed genoeg.

### In de praktijk

Een vogel is in de natuur afhankelijk van het voedselaanbod. Een zaadhandelaar maakt een mengsel, afhankelijk van de prijs van de zaden. Kanariemengelingen uit de handel zijn bijna allemaal te rijk aan raap- en/of koolzaad. Wij kunnen dit verhelpen door deze mengsels 'armer' te maken door er witzaad aan toe te voegen. De buik van een kanarie, zeker van een man, mag eigenlijk nooit een vetlaag vertonen. Ziet het buikje geel van het vet, dan hebt u ze te goed gevoerd. In de natuur vindt men geen te vette vogels.

Als het enigszins kan, geven we de vogels dagelijks zoveel voer dat ze de volgende morgen bijna alles hebben opgegeten. Zo worden ze gestimuleerd om alles te eten en niet alleen de lekkerste zadjes uit te kiezen. De voerbak moet ook zo dikwijls mogelijk schoongemaakt worden. Altijd maar bijvullen is uit den boze. Houd ook rekening met de hiërarchie in de volière. De eerste in de pikorde komt altijd eerst aan de bak en kiest dan ook de lekkerste zaden uit.

Ik wil u aanraden om nooit een grote voorraad zaad in huis te halen, zo vermijd je om de vogels oud voer voor te schotelen. Bewaar de zakken zaad ook niet op de grond, maar liever op een verhoging. Het is ook belangrijk om de zaden goed te mengen en niet zomaar wat uit de zak te scheppen. Zaden hebben een verschillend soortelijk gewicht. De samenstelling onder in de zak kan dan ook afwijken van de samenstelling boven in de zak.

In de winter hebben kanaries behoefte aan een arme voeding met weinig eivoer. Ik geef hen twee keer per week een hoeveelheid eivoer die in korte tijd op moet zijn. Elke vogelliefhebber weet dat vogels die koud gehuisvest zijn veel meer eten dan vogels die altijd warm gehuisvest worden. Gezonde kanaries kunnen best tegen wat lagere temperaturen. We moeten ze dan ook niet vet mesten.



Gepelde haver: wordt graag opgenomen en aan de jongen gevoerd.

Voor het broedseizoen hebben vogels behoefte aan een rijke voeding. Daarom geef ik mijn vogels vanaf twee weken voor het koppelen alle dagen eivoer.

Kanaries moeten ook altijd een grit/maagkiezelmengeling ter beschikking hebben. Daarin vinden ze scherpe maagkiezel die helpt om de zaden af te breken in de spiermaag en grit, een calciumbron die nodig is voor de vorming van het ei.

Vooraleer het hok te verlaten controleer ik altijd nog eens elke vlucht of de vogels allemaal hun natje en hun droogje gekregen hebben. Check en double check.



Hennepzaad (kempzaad). Zaad van de cannabisplant. In kleine hoeveelheden aan het mengsel toevoegen.

De nationale vogel van Turkije

# De Koperwiek

Mensen hebben zich door de eeuwen met dieren geïdentificeerd. De 'Nederlandse leeuw', die we op ons wapenschild voeren staat symbool voor kracht. Op andere schilden komen we de adelaar tegen, als symbool van macht, schoonheid en onafhankelijkheid. We kiezen dieren waarmee we ons als groep, land of streek onderscheiden van anderen. Hiervoor kiezen we dieren die uniek zijn, bijzondere vaardigheden hebben, veel voorkomen of gewoon mooi zijn. 'De nationale vogel van...!' laat u kennis maken met vogels die een officiële status hebben als nationale vogel en daarmee een representatief symbool zijn voor hun land.

Tekst: RIK MEEREMA

Foto: H. v.d. MEER





### De Koperwiek van Turkije

Over de wetenschappelijke naam van de lijster(s), *Turdus* zijn bijzondere dingen gedacht. Rond het jaar 600, dacht Isidorus dat het verband hield met het Latijn *tardus* wat laat betekent, omdat de vogel pas tegen de winter verscheen. Rond 1650 dacht Charleton dat het te maken had met het Latijnse *surdus*, wat doof betekent. In het Latijn bestaat de uitdrukking 'surdior turdo', wat zoveel betekent als Oost-Indisch doof. Tegenwoordig houdt men het erop dat het een klanknabootsing is, die ook het Engels thrush, het Duitse drossel en het Zweedse trast terug te vinden is. Over het tweede deel van de naam *iliacus* lijken minder misverstanden. *Ilia* betekent zoveel als lendenen of flank. De Flanklijster of Koperwiek.

Wie volgens de symbolenleer een koperwiek ziet of in zijn of haar dromen tegen komt, zal nieuws ontvangen. "De Koperwiek brengt nieuws en stuurt een uitnodiging. Wat die ook zal zijn, u zult nieuwe, leuke mensen leren kennen. Het uitspreken van een wens of een verzoek naar deze mensen kan in uw voordeel werken. Maar, pas op, het maakt u ook kwetsbaar." Bij uw volgende ontmoeting met een Koperwiek, weet u wat u te doen staat. Of deze symboliek ook een reden is geweest om de Koperwiek tot nationale vogel van Turkije uit te roepen is niet duidelijk.

### Grootte en uiterlijk

Koperwieken zijn kleine lijsterachtigen (ca. 22 centimeter) met een opvallende lichte wenkbrauw- en baardstreep en oranje-roestbruine flanken. De kop, het rugdek, en de staart zijn bruin. De vleugels zijn bruin met een donkere bin-

nenvlag. De keel, borst, buik en onderstaart zijn wit met opvallende donkerbruine vlekken. De poten zijn roze. Er is geen duidelijk geslachtsonderscheid. Koperwieken produceren een langgerekte, hoog geluid dat klinkt als 'tjehhh'.

### Leefomgeving en verspreiding

De Koperwiek is een broedvogel van het noorden van Europa. Hier broeden ze in naald- en berkenbossen. In het najaar trekken ze naar het zuid(westen) en komen in flinke hoeveelheden ook in ons land terecht. Als het ook bij ons serieus winterd, dan trekken ze verder naar het zuiden. Als broedvogel is de koperwiek in ons land zeldzame broedvogel. Er worden twee ondersoorten onderscheiden: *Turdus i. iliacus* die in onze streken het meest voorkomt. Soms vliegt er tussen de grote groepen 'gewone' Koperwieken een *Turdus i. coburni*. Deze ondersoort, te herkennen aan een donkere, bijna zwarte wang, dichte stippentekening op flank, buik en onderstaartdekveren, donkerder rug- en vleugeldek en donkere rozebruine poten. De ondersoort *Turdus i. coburni* komt voor op IJsland en de Faerøereilanden.

### Voedsel en leefwijze

Zoals eerder aangegeven, is de Koperwiek een vogel van Noord-Europa. In de winter trekken ze, vaak samen met andere lijsterachtigen, zoals kramsvogels, merels en lijsters naar het zuiden. Daar foerageren ze dan vaak op weilanden en akkers, graag in de nabijheid van struiken of boompjes. Hun voedsel bestaat vooral uit wormen en insecten. Uit de struiken en bomen worden ook graag bessen gegeten. In

het voorjaar keren ze terug naar hun broedgebieden, ze hebben er dan vaak een tocht van zo'n 15.000 kilometer op zitten.

### Voortplanting

In hun noordelijke broedgebieden kiezen ze een conifeer, den of berk als nestplaats. Op de toendra worden ook andere lage struiken gekozen, of er wordt zelfs op de grond gebroed. Koperwieken maken een merelachtig nest waarin over het algemeen vier tot zes blauwige eieren met kleine bruine stippen worden gelegd. De jongen komen na een broedtijd van slechts twaalf à dertien dagen al uit het ei en verlaten na circa veertien dagen het nest. De daarop volgende veertien dagen worden ze nog gevoerd. Hierna zijn de jongen zelfstandig.

### Bijzonder

De grote indeler en naamgever van het planten en dierenrijk, Linnaeus, maakte in de eerste editie van zijn *Fauna svecica* uit 1746 nog geen onderscheid tussen de Koperwiek en de Zanglijster. Hoewel voor dat moment *Turdus iliacus* voor de Koperwiek en *Turdus musicus* voor de Zanglijster al werden gebruikt. Het duurde tot de tiende uitgave, in 1758 tot Linnaeus onderscheid tussen de soorten maakte.

### De Koperwiek

Nederlands	Koperwiek
Wetensch. Naam	<i>Turdus iliacus</i>
Engels	Grive mauvis
Frans	Rotdrossel
Duits	Scharlachsichler



Geel gekweekt

# Een gele kleurkanarie: eenvoudig te kweken?

**Op het eerste gezicht is een gele kanarie  
heel eenvoudig te beoordelen** tekst: HENK BRANJE

**D**e intensieve vetstof gele heeft een glanzend diep gele kleur die goed doorvloeit in vleugel- en staartpennen. Een niet-intensieve heeft een diep gele kleur die overgoten is met heel korte schimmel.

Dat is de theorie. De praktijk, het kweken van een goede kwaliteit gele kanarie, is weerbarstiger. Het valt, net als bij zoveel andere kleurvariëteiten, niet mee om een topper te kweken. Daarom mijn oor maar eens te luister gelegd bij een 'geelkweker' die met z'n vogels op nationale shows het nodige eremetaal gewonnen heeft.

Waar moet je zoal op letten?

## Type

In de eerste plaats is het enorm belangrijk dat de vogel een mooi type heeft: een mooie volle kop in combinatie met een vol lichaam. Niet vet en niet mager. Niet te iel, niet te klein, maar zeker ook niet veel te groot en te lang. Alles in de juiste verhoudingen. En daar moet je als kweker streng op selecteren. Een selectie die belangrijk is bij het samenstellen van de kweekkoppels. Soms kan een kleine tekortkoming bij de ene oudervogel gecompenseerd worden door een 'ietsje teveel' bij de andere oudervogel.

De kwaliteit van het geel. Een gele kleurkanarie, zowel een intensieve als een niet-intensieve, dient een

zuiver gele vetstofkleur te bezitten. Dus niet neigend naar oranje achtig, 'te warm' zoals de kweker en keurmeester dat noemt. De kwaliteit van die gele kleur is sterk genetisch bepaald. Dat betekent dat selectie zeer belangrijk is. Vogels die neigen naar 'n fractie oranje dienen absoluut uitgeselecteerd te worden. En dat kun je al zien bij jonge vogels! Tijdens de rui worden er 'opeens' verschillende jonge vogels aan de iets warmere kant geel. Deze jonge vogels hoef je niet verder aan te houden voor de kweek.

Ofschoon door verschillende kwekers wordt beweerd dat de gele vetstofkleur door het voeren van raapzaad negatief beïnvloed wordt (de vogels zouden te 'warm' worden) is het daar niet elke geelkweker mee eens. Wel moet je geen onkruidzaden voeren aan gele vogels omdat deze kleurstoffen bevatten die wél de gele tint beïnvloeden.

Geel schimmel  
Foto: P. Onderdelinden



### Egaliteit

De gele vetstofkleur dient egaal verdeeld te zijn over het gehele lichaam. Ook al iets waar je op moet selecteren. Die egaliteit kun je eigenlijk pas goed beoordelen wanneer de vogels goed door de rui zijn en zich goed ontwikkeld hebben. Bijvoorbeeld in oktober/november wordt de egaliteit streng onder de loep genomen.

**Kleur van de vleugel- en staartpennen**  
Of de vleugel- en staartpennen goed doorgekleurd zijn is voor een heel belangrijk gedeelte erfelijk bepaald. Dus ook hier geldt om vogels met te lichte vleugel- en staartpennen uit te selecteren. Het is trouwens best moeilijk om met name bij niet-intensieve gelen goed doorgekleurde vleugel- en staartpennen te realiseren. Maar door goede selectie zul je langzaam maar zeker de goede kant op gaan.

### Intensief of niet-intensief

Wat de kwaliteit en egaliteit van de gele vetstofkleur betreft is er geen verschil tussen een intensieve of een niet-intensieve vetstof kanarie. De kleur moet egaal zuiver geel zijn en niet vlekkelig zijn. Vlekkeligheid houdt in dat de kleur niet overal egaal geel van kleur is. Hetzelfde geldt voor het goed doorkleuren van vleugel- en staartpennen. Voor de kweek van geel-intensieve kanaries wordt een volledig intensieve vogel gekoppeld aan een partner met een minimaal bezit aan schimmel (intensieve man of pop aan een partner met iets schimmel. En die schimmel het liefst zo egaal mogelijk verdeeld, dus zonder ophoping in de nek.

Een intensieve gele mag geen spoortje schimmel laten zien. Een niet-intensieve moet over het hele lichaam een korte goed verdeelde schimmel laten zien. Dat is heel gemakkelijk om hier op papier te zetten, maar in de praktijk is het natuurlijk heel moeilijk te realiseren door de vogelliefhebber. Maar dat is uiteraard de uitdaging!

### Kleurstof

Al vele jaren zijn er kleurstoffen voor gele kanaries op de markt (Tachetes, Geel intensief van Quiko). Over de werkzaamheid van deze producten is, uiteraard, volop discussie. Ben je als geelkweker tevreden over de vetstofkleur en het doorkleuren van de pennen, dan is dat prima. Onze kweker uit Helmond verstrekt als sinds jaren een vloeibare kleurstof door het eivoer die afkomstig is uit de humane sector. Het product is een kleurstof die verkrijgbaar is in reformwinkels. Het wordt door bakkers gebruikt voor het geel kleuren van hun baksels. Het wordt gevoerd vanaf het uitkomen der eieren totdat de jonge vogels gespeend worden. Daarna wordt geen kleurstof meer verstrekt.

### Vorbereiden op de show

Zo'n zes weken vóór de eerste show worden ook de gele vogels gecontroleerd op de kwaliteit van de pennen. Gebroken pennen worden voorzichtig verwijderd. De vogel heeft dan nog alle tijd om nieuwe pennen aan te maken. Zo'n nieuwe pen wordt doorgaans ietsje langer dan de pennen die niet verwijderd zijn. Daar moet je rekening mee houden om te voorkómen dat je een scheve staart krijgt. Zo'n twee weken voor de show gaan de vogels uit de vlucht of broedkooi naar de wedstrijdkooi. Elke week kunnen de vogels een bad nemen (met regenwater in plaats van kraanwater). Worden de vogels voor de wedstrijd nog met de hand gewassen, dan mag je verwachten dat ze net iets glanzender en helderder voor de keurmeester verschijnen.

### Wet van de grote getallen

Het uitgangsmateriaal, de kwaliteit van de kweekvogels, is van het grootste belang. Hoe beter de kwaliteit van de oudervogels, des te beter kwaliteit jongen mag je verwachten. Maar... het toeval speelt natuurlijk ook een rol. Uit goede koppels vallen ooit matige jongen en uit wat mindere koppels vallen ooit toppers. Hoe meer jongen je kweekt, des te meer kans op 'tobbers', maar ook op 'toppers'. Het geluk speelt dus wel degelijk een rol.

Maar.... je kunt als liefhebber, zoals hierboven besproken, wél een handje helpen door een goede voeding en strenge selectie.

En niet te vergeten de voorbereiding op de show. Zorg voor rustige vogels die bovendien 'om de punten vragen'. Een rustige vogel die zich goed presenteert zal bij de keurmeester altijd een veel betere indruk maken dan een vogel die onrustig blijft! En dat heeft zeker z'n invloed op de beoordeling in punten!

Geel intensief  
Foto: P. v.d. Hooven



# Het begon zo

**Familie van ons houdt op bescheiden schaal papegaaien. Ze hebben een ruime tuin aan de andere kant van ons dorp. De behuizing van die vogels is half buiten half binnen.**

Voorzien van veiligheidsslot was er toch op een ochtend een deurtje een beetje open blijven staan en vervolgens een vogel gevlogen. Het was het mannetje van een jong koppel blauwvoorhoofd amazones. De pop zat rustig op stok maar vriend was niet te vinden. Zou die zelf een ingewikkeld slot open gepeuterd kunnen hebben? De vluchteling werd snel rond gebeld en op facebook verspreid. Maar hoe vreemd kan het gaan, want amper was de ontsnapping bekend of horen we hier geschreeuw in de bomen. Buurvrouw komt ook aanlopen. Ja hoor, daar zit een papegaai in onze tuin! En vrolijk zagen we hem van tak tot tak gaan. De afstand was ongeveer één kilometer. Snel gebeld en daar kwam de eigenaar met een grote kooi met daarin de pop. Deze werd hier in de tuin gezet met slot en bovenop een bak lekker voer. Vond hij leuk want hij vloog er gelijk overheen en . . . verdween in de ruimte. Het werd echter nog gekker, want hoor maar: hier in onze gemeente is een streekziekenhuis

De zoon van de eigenaar van de ontsnapte amazone was daar voor een paar dagen opgenomen. Die belde zijn ouders met de boodschap dat er zojuist een papegaai even op de vensterbank naast zijn bed was geland en direct doorgevlogen naar een hoge boom in de tuin van het ziekenhuis. Kan die van ons geweest zijn? Ja dus en weer één kilometer verder weg. Toen, na twee dagen stilte, kwam er een melding: papegaai gezien bij iemand



met een grote tuin aan de rand van dorp. En weer ongeveer één kilometer terug in de goede richting. Zou dat nog resultaat kunnen hebben?

Een vroeg avondrondje door die tuin gedaan en ze zagen en hoorden hem. Afsgesproken dat ze wat later op de avond terug zouden gaan in de hoop dat ze hem op een rustplek konden vatten. Maar de vogel was niet meer te vinden. Het werd toen een paar dagen heel slecht weer met harde wind en veel regenbuien. Na een paar dagen werd het weer wat beter en er kwamen weer berichtjes binnen. Hier gezien en daar gehoord. Zelfs een berichtje met foto, kilometers van huis en in een heel andere richting, dichtbij het gemeentelijk bos, een soort park met een grote visboezem. Eigenaar daar naartoe met fototoestel. En ja hoor, daar zat die ondeugd heerlijk wiegend op een dikke tak boven het water! Zo relax zag dat er uit, maar ze konden niet anders dan afzien en terug naar huis. Zo'n grote afstand en in een totaal andere richting, helaas. De kooi met de pop was toen

al twaalf dagen eerder terug gehaald; die pop zat weer lekker thuis, maar wel alleen. Voor de zekerheid, want je weet maar nooit, hadden ze wel een vangkooi neergezet naast de volière met een bak voer en die kooi was vanaf een afstand dicht te maken. De amazone was toen al twintig dagen voortvluchtig. En daar kwam hij toch weer bij ons in de tuin herrie maken! Maar hij bleef niet in de buurt. Heb wel snel gebeld dat ik hem weer gezien en gehoord had. De dag daarna kwam de eigenaar heel blij foto's laten zien. En hij vertelde het happy end. De papegaai was 's morgens vroeg in hun tuin geland en zat heerlijk zijn krop te vullen in de vangkooi naast zijn vriendin! De kooi sluiten ging geruisloos en dat was dat. De vogel was weinig verwilderd, dat viel mee. En hij verkeerde nog in prima conditie. In de volière op stok werd weer gesmoesd en geknuffeld. Drie weken op vakantie geweest en nou zijn we er weer. Ieder die zo mee geleefd had kon later meegenieten van de foto's op facebook. Dat was dus eind goed al goed. Geertje





## NU AL BEGINNEN MET NESTKASTEN OPHANGEN VOOR MEZEN

Tekst: GERRIT FRANK

Veel mensen hangen nestkastjes op in de nabijheid van hun huis. Ze zouden het leuk vinden om eens van nabij het gezinsleven van een koppel vogels, vooral meesjes, mee te maken. Het ophangen van een nestkastje leidt lang niet altijd tot een bezoek van vogels die er daadwerkelijk in gaan broeden. Waarom zijn er geen vogels in gaan broeden?

Te kust en te keur worden nestkastjes in diverse zaken en tuincentra aangeboden. Het ene nog fraaier dan het andere. Eén ding is hierbij wel zeker: de garantie dat er ook echt vogels in zullen gaan broeden kan de verkoper van het kastje niet geven. We kunnen de natuur soms wel een handje helpen, maar succes van zo'n poging blijft discutabel.

### Goede plek

Na wat heen en weer gevraagd of een kijkje ter plaatse, kun je soms tot vreemde ontdekkingen komen. In de loop van de jaren heb ik heel wat keren heel rare dingen gezien. Nestkastjes hangend aan de bovenrand van een schutting, op het boeiboord van garage of schuur net onder de dakrand, het 'gangpad' van de kat van de burens! Kastjes midden op een kale stenen muur, waar de hele dag de zon op kan staan....

Geen uitnodigende plekjes, al zal zo'n kastje wel eens een kennismakingsbezoek krijgen. Broeden echter..... Neen. Een juiste hangplek is en blijft heel belangrijk. Een beschutte plek die geen last heeft van bijzondere weersinvloeden, storm, regen, zon(hitte). Het beste plekje is altijd nog tegen een boomstam. Echt hoog hangen is niet nodig. Vanaf twee meter boven de grond is het al goed. Ophangen doe je al in oktober, november zodat passanten al kennis kunnen maken en het eventueel kunnen gebruiken als winterslaapplaats. Het wordt zo op tijd een onderdeel van de leefomgeving van de vogels in een bepaald gebied.

### Aanvliegroute

De aanvliegroute is erg belangrijk. Een vrij uitzicht en een flink stuk open ruimte vóór het kastje is van doorslaggevende betekenis voor al of geen succes. De beste plaats is die waarbij de invliegopening op het oosten of zuidoosten ligt, maar wel beschermd blijft tegen te felle zon!



### Territorium

Het al of geen succes hebben met de bezetting van een kastje hangt nauw samen met het aantal kastjes in de omgeving en het aanwezig zijn van voldoende voedsel-insecten. Normaal zie je in najaar en winter flinke groepen pimpelmezen met elkaar rondscharrelen in een bepaald gebied, maar zodra de broeddrang op begint te spelen bakenen ook de pimpelmezen hun broederf af en wordt elke indringer van de eigen soort verwoed verjaagd.

## WEBSHOP NBvV:

[shop.nbv.nl](http://shop.nbv.nl)

### OVERLEDENEN

**P. Evers** uit Roermond

was erelid en oud-penningmeester van V.V. "Onze Zangers", afd. Roermond (R38).

Mevr. **G.J. van Rumpt-van Kesteren**, Gameren (Z17); **R.H. Graafmans**, Waalwijk (K13); **H.D. Stoppels**, Delfzijl (D22); **G. Speerstra**, Nijland (B44); **G.J. Ribberink**, Bruchterveld (H31); **H. Dijkstra**, Kollum (S32); **D. Does**, Groningen (G21); **J. Roeters**, Ammerzoden (A06); **P. Joosten**, Driel (G24); **A. Zijlstra**, Surhuisterveen (L25); **D.G. de Wilde**, Rijssen (R06); **T.M. Frikken**, Beerta (O16); **H. Metzke**, Sprang-Capelle (529); **W. Tuinstra**, Drachten (D17); **F.B.J. Gasseling**, Wehl (W12); **W.H.F. Knops**, Neerbeek (411); **M.N. van Gorp**, Best (B09); **D. Voets**, Schijndel (H54); **G. de Jong**, Tilburg (G08).

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.



## ERELEDEN

L.M.G. Bertina, C. van Elven, H. de Geus, R. Grefhorst, J. Heesakkers, H.P.G.M. van Hout, J.A.M. Kerkhof, P.J.F. Klören, T.J. Koenen, C.G. Maandag, H. Marinus, S. Muniksma, Mr. H.J.M. Stienen, P. Stijnen, H.K. v.d. Wal, C.W. Westland, W. Zijlstra.

## LEDEN VAN VERDIENSTE

J.J. Aelbrecht, J. v/d Beek, E.B.A. Berns, T. Bielderman, K. Bink, B. Bosch, H. Branje, A. Castermans, R. van Dijk, A. Gort, P. Hagenaars, K. Haisma, B.A.M. Horsting, A.J. Houtkooper, H.F.M. Jansen, J.M.C. van Kempen, G. Koenderink, J. Kreijveld, C.H.M. van der Linden, C. van Lunteren, A. Mertens, A. van Mingerot, A.P.F. van Niel, P. Ooijen, C. van Oosterhout, J. Perdon, H. van Segelen, R. Steenbakkens, H. Suichies, W.A. Tolman, P. v.d. Tuin, J. Wijnhoven, H. Wouwenaar, K. Zegelaar.

## DE BONDSRAAD IS ALS VOLGT SAMENGESTELD

**Hoofdbestuur**  
Voorzitter: Klaas Snijder, tel. 0513-416610, E-mail: k.snijder@home.nl  
2e voorzitter: Albert Zomer, tel. 0546-456146, E-mail: albertzomer1958@outlook.com  
Secretaris: Sjaak van Bennekom, tel. 035-6562027, E-mail: jvanbennekom@hetnet.nl  
Penningmeester: Dirk Verburg, tel. 0113-502676, E-mail: cn.vogel@zeelandnet.nl  
Bestuurslid: Huub Mertens, tel. 06-19053510, E-mail: huubmertens54@gmail.com

### Districtsvoorzitters

**Groningen:** Sjoerd Westerhof (a.i.), tel.: 06-30308081, E-mail: sjoerdwesterhof@kpnmail.nl  
**Friesland:** Sicco Veenstra, tel.: 0515-573722 / 06-54351180, E-Mail: siccoveenstra@hotmail.com  
**Drenthe:** Matthijs Slagter, tel. 050-230 81 03, E-mail: m.r.slagter@hotmail.com  
**Overijssel:** Harry Oude Vrielink, tel.: 0546-622818, E-mail: Yurley2@kpnmail.nl  
**Gelderland:** Wim Theloozen, tel. 0481-375789, E-mail: wim.theloozen@gmail.com  
**Utrecht:** Ronald van der Putten, tel. 06-22399614, E-mail: rjvanderputten@ziggo.nl  
**Noord-Holland:** Ruud Kok, tel. 06-20302122, E-mail: ruudkok18@gmail.com  
**Zuid-Holland:** Kees Diepstraten, tel.: 010-5911812, E-Mail: cbdiepstraten@gmail.com  
**Zeeland:** Leo Quist, tel.: 0166-652150, E-mail: leoquist@zeelandnet.nl  
**West Noord-Brabant:** Jack Burm, tel.: 06-22698301, E-mail: j.burm1.1@kpnmail.nl  
**Oost Noord-Brabant:** Peter Verkuijlen, tel.: 06-46615193, E-mail: peterverkuijlen@ziggo.nl  
**Limburg:** Jan Geenen, tel.: 06-48097029, E-mail: j.geenen@home.nl

### Voorzitter keurmeestersvereniging

Willem Smit, tel. 06-13782511,  
E-mail: wsmit63@icloud.com

### Voorzitter vereniging speciaalclubs

L. Wooning, tel. 0182-385921, E-mail: Fr.wooning@live.nl

*Gelieve correspondentie voor hoofdbestuur en bondsraad naar het bondsbureau te zenden.*

## VERTROUWENSPERSOON

Jan Perdon,  
tel. 06-53256215, E-mail: pdteh@home.nl

## BONDSBUREAU

Bezoekadres:  
Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom.  
Postadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.  
Telefoon: 0164-235007  
E-mail: info@nbvv.nl  
Internet: www.nbvv.nl  
*Het bondsbureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur.*

## SECRETARIAAT KEURMEESTERSVERENIGING

Hans de Boer, Kraatsweg 40, 6712 DC Ede,  
tel. 06-42812029, E-mail: secretariaatkmv@gmail.com

## TECHNISCHE COMMISSIES

**Kleur- en postuurkanaries**  
Rein Grefhorst, Warenargaarde 814, 7329 GS Apeldoorn,  
tel. 055-5414227, E-mail: r.grefhorst@planet.nl  
**Tropische vogels en Parkieten**  
André Gerritsen, Rijnstraat 19, 4031 KK Ingen,  
tel. 0344-601892, E-mail: a.gerritsen274@upcmail.nl  
**Zang**  
Erik Buizer,  
tel. 06-36208353, E-mail: e-buizer@hotmail.com

## SPECIAALCLUBS

Voor de liefhebbers van vrijwel elke vogelsoort kent de NBvV een speciaalclub. Het lidmaatschap van de speciaalclubs is in principe voorbehouden aan hen die lid van de NBvV zijn. Onderstaand hun contactinformatie. Verdere informatie kunt u vinden op onze website.

### Speciaalclub Europese Cultuurvogels

T. de Boer: 06-13211143 / secretariaat@info-sec.nl

### Parkieten Speciaalclub

Frans Broeren:  
0165-327156 / secretaris@parkietenspeciaalclub.nl

### Insecten-en Vruchtenetende Vogels

Sytse Andringa:  
06-20740012 / secretaris@vogelspeciaalclub.nl

### Japane meeuwen en overige Lonchura's

P. Linskens: 06-17394904 / secretariaat@jmc-lonchura.nl

### Natuurbroed Gouldamadine

H.J. Koning: 06-55374009 / secretaris@sngn.nl

### Nederlandse Zebraavinken Club

Eric Kuijpers: 073-5210343 / ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl

### Afrikaanse Prachtvinken

Theo Helmink: 023-5290544 / info@scapnl.com

### Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines

Simon Branderhorst: secretaris@prachtvinken.nl

### Werkgroep Amerikaanse Sijzen

Dhr. B. Prins: 06-54226003 / a.prins.bp@gmail.com

### Nederlandse Kleurkanarie Club

Marga van Eerden:  
010-4834226 / nkc-ledenservice@hetnet.nl

### Speciaalclub Kleurkanaries

Sjaak Verkoeijen:  
06-14168732 / info@speciaalclubkleur.nl

### Speciaalclub Zangkanaries NZHU

P.C. Hagenaars:  
06-10474218 / piethagenaars@outlook.com

### Speciaalclub L.S.H. Harzers

B. Rhee: 0546-825987 / rhee1234@hetnet.nl

### Speciaalclub Waterslagers "De Nachtegaal"

J.J. de Bruine: 0527-688488 / jandedebuine@me.com

### Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland

Erik Hulsmans:  
06-15137718 / bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl

### Nederlandse Speciaalclub Mozaïek Kanaries

H.H.J.S. van der Kolk: 06-50526912 / http://nederlandse-speciaalclub-mozaiek-kanaries.nl/

### Spanish Timbrado Society

Matthew Sprangers:  
06-12887765 / timbradosociety@gmail.com

### Speciaalclub Postuurkanaries NPV

H.M. Onstenk: 06-53891234 / info@NPVn.nl

## HEEF U VRAGEN OVER VOGELS?

### STEL ZE AAN ONDERSTAANDE SPECIALISTEN:

#### Harzers en waterslagers:

Joop Aelbrecht,  
Eufraat 3, 1186 JJ Amstelveen,  
E-mail: Aelbrecht@ziggo.nl

#### Timbrado's:

Harry Smit,  
tel. 030-6062046, E-mail: harrysmit44@hotmail.com

#### Kleurkanaries:

Gerard Verhaegen,  
Schaepmanlaan 9, 4641 BX Ossendrecht,  
tel. 06-23582296, E-mail: gerardverhaegen@ziggo.nl

#### Postuurkanaries:

Theo Minten,  
Mr. Beumerstraat 44, 5986 CE Beringe, tel. 077-3076039  
E-mail: thm.minten@home.nl

#### Europese cultuurvogels en hun bastaarden:

Piet de Dreu,  
Buys Ballotstraat 7, 4462 AM Goes,  
E-mail: dreupit@kpnmail.nl

#### Grasparkieten:

Jan Bouwmeester,  
Dahliafeld 1, 2914 CA Nieuwerkerk a/d IJssel,  
E-mail: jfbouwmeester@hotmail.com

#### Grote parkieten en agaporniden:

Rien Steenbakkens,  
Dr. Boutkanstraat 1, 5473 AK Heeswijk Dinther,  
E-mail: riensteenbakkens@home.nl

#### Zebraavinken, Japanse meeuwen en hun bastaarden:

Francis Kriesels,  
Bilderdijkstraat 18, 3202 AE, Spijkenisse,  
E-mail: francis.kriesels@xs4all.nl

#### Tropische vogels en hun bastaarden, duiven en kwartels:

Pieter van den Hooven,  
Violenweg 8, 8042 AR Zwolle,  
E-mail: pieter.hooven@gmail.com

#### Vruchten-en insecteneters:

Rick van Groningen,  
tel. 06-34200301, E-mail: vangroningenrick@gmail.com

*Bij vragen over artikelen in Onze Vogels kunt u informeren via de redactie of het bondsbureau.*

## De gloster is een dankbare vogel

# November



**V**eel liefhebbers beginnen met glosters omdat het lieve vogeltjes zijn die over het algemeen niet moeilijk te kweken zijn. Dat is zeker een goed idee wanneer je met postuurkanaries wil beginnen 'om het vak te leren'. Wil je glosters kweken voor de vogelshow, dan is dat niet zo gemakkelijk.

Er wordt een klein vogeltje gevraagd dat daarnaast een brede kop, nek en rug heeft. Het valt niet mee om dat allemaal in een klein vogeltje te realiseren. Vandaar dat we op de shows vaak mooie volle glosters zien die aan alle eisen voldoen, behalve... aan de grootte. Ze zijn namelijk vaak wat te groot! Vaak zie je dat, wanneer de rest van het vogeltje uitmuntend is, de keurmeester wat coulant omgaat met zo'n iets te grote gloster.

De gloster blijft nog steeds erg populair: het is een prettig, weinig eisend vogeltje. Voor de kweek heb je geen al te grote broedkooien nodig. Glosters zijn al snel tevreden met een kleine ruimte. Ook qua

verzorging vraagt de gloster weinig extra's. Een goed zaadmengsel, op tijd wat eivoer, een beetje groen of fruit en, natuurlijk grit of maagkiezel. En uiteraard elke dag vers water. Je moet wel oppassen dat je de vogels niet overvoert. Glosters hebben namelijk de neiging om nogal snel te vet te worden. Dat is in de broedtijd niet zo goed, maar ook in de wedstrijdlooi kan het model zoek raken wanneer een vogel te vet is.

Voor het overige zijn het gemakkelijke vogels; aanraders voor nieuwelingen in de postuurkweek.

Heb je plannen om met glosters te beginnen en ga je op stap om vogels te kopen, let dan op het volgende:

- Het lichaam moet kort en gedrongen zijn.
- Ook de staart moet kort zijn.
- Een gekuifde (corona) moet een mooi ronde en iets gewelfde kuif hebben.
- De kuif mag niet over de ogen vallen.
- Koop een gekuifde (corona) en een

ongekuifde (consort) partner

- Bij de kweek paar je bij voorkeur een kuifman x gladkop pop of omgekeerd.
- Liefst een van de partners wat intensiever; het is beter voor het verenpak en geeft minder kans op veerproblemen (lumps)

### Beoordeling

Bij de beoordeling wordt met name gekeken naar:

- **Corona**  
regelmatig gevormde en centraal geplaatste kuif; in de nek moet deze kuif goed aansluiten op de nekbevedering. Het midden van de kuif moet centraal in het midden geplaatst zijn en zo klein mogelijk.
- **Consort**  
een brede en ronde kop met duidelijke wenkbrauwen
- **Het lichaam**  
kort en gedrongen met een goed gevulde rug en iets gewelfd
- **De grootte**  
tussen 11.5 en 12.0 cm

VERSELE-LAGA

# Prestige

*Elke vogel eet zoals hij gebekt is!*



Ontdek daarom **PRESTIGE**, de ruimste keuze aan gevarieerde zadenmengelingen **voor alle vogelsoorten**.

- 100 % natuurlijke zaden
- extra geborsteld en gereinigd
- zonder additieven of kleurstoffen



VERSELE-LAGA

YOUR BEST CHOICE

[www.versele-laga.com](http://www.versele-laga.com)

Deli Nature

'Delicatesses' From Nature

*"Topmengelingen wereldwijd aanbevolen door topkwekers!"*



Serengeti

Down under

Amazonia

Pantanal



Bij de aankoop van Deli Nature producten, brengt u bij tot het behoud en bescherming van bedreigde vogelsoorten en hun habitat.

[info@delinature.be](mailto:info@delinature.be) - [www.delinature.be](http://www.delinature.be)